

YALE
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL
LIBRARY

AVICEN=

NAE ARABIS MEDICO-
rum ob succinctam breuitatis copiā,
facile principis Q uarta fen, pri-
mi : de vniuersali ratione
medēdi. Interprete Ia-
cob Mātino Me-
dico Hebręo.



Parisijs
IN OFFICINA CLAVDII
CHEVALLONII.
Anno 1532

ANDRÆE GRITI, SERE-
niss, ac excellentiss, Venetiarum
Principi, Iacob Mantinus
Hebræus secundam
optat fortunam.



NT ER eos qui haften⁹ Arabice de
medica arte scripsere, serenissime prin-
ceps, clarissima omnium cōfessione pri-
mus Auicennę glorię locus attributus
est. Nam licet quę composuit ab antiquioribus,
præsertim græcis, copiosissime ornatissimeq; tra-
dita fuerint, ea tamen omnia doctissimus ipse fœ-
lici breuitate in mirificum redegit ordinē, ita vt
eo docente multo facilius quàm alijs omnibus,
ea quę ad medendi rationem pertinent, percipi
valeant. Quare velut lege quadam sancitum est,
vt in publicis gymnasijs, Auicen. opera maxima
animorum satisfactione legantur, eiusq; libri plu-
rimos expositores habuerint, quod nō itidem cæ-
teris obtigisse videmus. Sed quoniam Auicenna
in scribendo, gentilitio ac sibi peculiari, arabico
idiomate vsus est, quod à latinis hominibus non
ita facile comparatur, eius operum traductio ma-
ximis ac multis erroribus scatet, quos Andreas
Beluenfis ætatis nostrę medicus insignis, & ara-
bica latināque lingua pariter eruditus, magna ex
parte laudabiliter emendauerit, alieno tamen se-
mine campum penitus expurgare non potuit: sed
adhuc plurima relictā sūt quę veluti nebula qua-
dam veritatē lectionis obducant. Quamobrem
ego qui

ego qui nihil magis proprium hominis esse semper existimaui, quàm quoquo modo vniuersis vtilitatem conferre mortalibus, quemadmodum pleraque in varijs facultatibus ex hebraico in latinum sermonem conuerti, ita nunc aliquos Auicennæ cōmentarios aggressus, eos maculis omnibus emēdatos, ac quod fieri possit, absolutissimos latinitate donatos, tanquam euidentis animi mei indicium legētibus offerre decreui. qui postquam meam cum aliorum interpretationibus comparauerint, quid mihi debeāt ipsi viderint. Cum autem tres potissimū Auicennæ partes in gymnasijs publicè legantur, videlicet prima pars primi libri, quæ prima fen primi dicitur, & quarta, quæ quarta fen primi nūcupatur, ac prima pars quarti libri, quæ prima fen quarti appellatur, ea omnia in latinam orationem vertere proponens, à quarta fen primi libri interpretari exorsus sum. quia hæc pars maiorem cæteris in vniuersali medendi arte vtilitatem afferre videtur, & hanc primo in lucem ædere volui. Mox autem, annuēte deo optimo maximo, ad reliquas expediendas accingar. Cum vero omnes ferè qui aliquod literariū opus in lucem ædere meditantur, alicuius patrocinio commendatum emittant, idem mihi facere cogitanti, tua verè serenitas occurrit, quæ tanta est vt quascunque animi tenebras atq; perturbationes solo intuitu discutere valeat. quādo ea te pulchritudine ac dignitate corporis exornari cōtigat, vt nemo te cōspectior hactenus imperasse credatur, cui animi pulchritudo, cum prudentia, tum consilij maturitate, vt effectus ipsi probāt, ac omnium

a ij moralium

moralium virtutum probitas æque respondet, tibi-
biq; potissimum duabus de causis, hac æditionem
nostram deberi arbitror, vel quia vestro florentis-
simo studio Patauio à puero fuerim semper addi-
ctus, nunc vero præcipue ob egregiam eorum eru-
ditionem qui ibi publice profitetur, vel quoniam
respub. cui tu merito præsides iustius antiquiori-
bus præponenda quàm recentioribus comparan-
da, ita de me iam merita est, vt omnia illi debeam,
omnia optem. Ne vero in dicendo sim prolixior
quàm ipsa res postulare videtur, has princeps il-
lustriss. tuo nomini dicatas elucubrationes susci-
pe, tuâque si opus fuerit authoritate defende. non
quòd eas te dignas existimem, sed vt mea tibi mens
aliquaudo manifesta fiat, quæ publice ac pri-
uatim huic ciuitati pro viribus inserui-
re proposuit. Nectamen gratum ideo
tibi minus me futurum spero,
cum qui quod potest dat,
omnia dedisse censerì
debeat: Vale.

Fen

FENQVAR

TA PRIMILIBRI AVI-
CENNAE, IACOB

Mantino Hebræo Medi-
co interprete.

Fen quarta, de rationum medendi diuisione
ne 31, capitibus distincta.

Caput primum fen quartæ, sermo vniuersalis
de medendi ratione.



V rationem aliquo trium perfici
dicim⁹; vel regimine & ipso vi-
ctu, vel medicaminum vsu, aut
manus artificio, quod chirurgia
appellatur. intelligo autem per
regimen vsu causarū necessa-
rium, quæ iam iuxta cōmunem consuetudi-
nem enumeratę sunt, in quibus vict⁹ ipse cō-
tinetur. Iudicia autē regiminis, si eorū qua-
litatem spectes, similia planè sunt medicami-
num iudicijs. Verum inter hæc, ipsa victus
ratio, quoad quātitatē, iudicia sibi propria ha-
bet, nam quandoq; alimentum tollimus, quā-
doq; minuimus, nonnunquā æquamus, & in-
terdum augemus. Aufertur in totum alimē-
tum,

CAPVT

tum, cum medicus cupit naturam vacare humorum coctioni. Minuitur, vbi studet vt vires alimento conseruentur: & tū virium curā habet, vel fortasse minuitur vt materiæ prospiciatur, ne scilicet natura sit circa nutrimentū multitudinē impedita. Interim tamē semper curę sit id quod magis vrget, vt quod præstātius sit, nepe vires ipsę, præsertim si admodū imbecilles fuerint. Cæterū alimētum dupliciter minuitur, quātitate, aut qualitate, aut si liceat tertiū ex his duobus constituere modum, potes. Interest autem inter quātitatem, & qualitatem, quoniam interdum alimētum est multum in quantitate, parum nutriēs tamen: vt sunt olera & fructus, multiplicare enim hæc, est multiplicare quantitatē alimentī, non eius qualitatem. Et quandoq; alimentum est exiguum in quantitate, multū tamen quoad nutritionem: vt sunt oua, & testes pul-
lorum gallinaceorum. Nos autem quandoque qualitatem minuere, quantitatem vero augere cogimur: vt cum appetitus ad cibum vehemens fuerit, & in venis humores crudi fuerint, vbi nos huiusmodi appetentiā replēdo ventriculū sedare curamus, illūq; humorē exuperantem à venis arcere, vt si quid est in eis primo concoquāt. alijsq; rationibus præter has, id facimus. Nōnunquā etiā qualitatem augere,

augere, quantitatē vero minuere debemus: vt cū vires roborare cupim⁹, sed ipsa natura vetriculi imbecillior redditur, vt ad cōcoctionē pleniorē se validam reddere nequeat. Minorare autē vel auferre alimentū quærimus, cū morbos acutos curam⁹, nā etsi in diuturnioribus victū quoq; minuamus, minus tamen q̄ in acutis, quoniā vires magis obseruamus in morbis diuturnis, cū horū iudiciū ac vigorē satis distare non ignoremus, quod nisi fieret, nequaq; posset vsq; ad tempus iudicij virtus cōseruari: nec durāte diu tēpore cōcoctionis, cōcoquere quidē posset. At acutorū morborum iudiciū propinquum est, ita vt ante eorum vigorē vires admodū dissolui nō dubitemus. Vel si id timuerimus, non tamen vsq; adeo alimentum minuemus. Cūq; ægritudo p̄pinquior fuerit principio, casusq; mitiores fuerint, tūc egrū alemus his, quę vires fouēt. Sed quādo ægritudo processerit in crescēdo, casusq; ipsi augescere ceperint, tūc alimentū minuemus, cū quia in nostro præcedenti victu, iam intrepide confidimus, tum etiā, vt tēpore quo virtus certat, eā exoneremus. In vigore autē cōsistendi, victum in extremo attenuare studebimus: & quāto morbus acutior, eiusq; iudiciū p̄pinquius fuerit, tāto victum magis attenuabim⁹: nisi aliquę superuenerint

a iij causā,

CAPVT

causę, quę nos id agere impediunt: vt in particulari nostra cōmentatione id à nobis explicabitur. Alimentum insuper ea ratione qualitat, duo alia habet officia. nēpe vel quod cito penetrat, vt vinū: vel tarde, vt affata, & tosta, ad hęc, aut quod id quoq; sanguinis quod ex eo generatur, est crassę ac tenacis substantiæ, vt est alimētū carnis porcine & vituline: aut tenue & facile aptū dissolui, vt est id quod ficubus vinoq; constat. Alimēto igitur quod cito penetrat indigemus, cum vitalem virtutem deficientem subleuare, eamque excitare desideramus, vbi ventriculus aut virtus non perficiunt concoctionem cibi tardę concoctionis. Cauebimus autem cibum concoctu facilem, vbi contingat præcessisse alimētum tardę concoctionis. Timendum enim est, ne illi admisceatur & ad illū modum iam prius nobis expositū res reuertatur. A crasso vero abstinēbimus vbi metus impendet de obstructionū aduentu. Alimentum tamen validissimę nutritionis, tardęq; cōcoctionis eligim⁹, vbi quēpiā roborare, eumq; validis exercitationib⁹ tradere cupimus, sed leue præeligimus alimentum ei, qui in meatuū obstructionem facile incurrit. Vfus autem medicaminum tres continet regulas. Prima in eligenda qualitate ipsius medicaminis consistit: videlicet

videlicet vel calidi, vel frigidi, vel humidi, vel sicci. Secunda in quātitate deligēda: quæ quidem bifariam diuiditur, nempe vel in mēsuram ponderis eius, vel in metiendā eius qualitatem, hoc est gradum caloris aut frigoris eius, aut alterius id genus. Tertia autem cōsideratio est ipse ordo temporis eius. Dirigit itaque nos, ad qualitatem medicaminis simpliciter eligendam, cognitio generis morbi, quoniā cognita ægritudinis qualitate, eligendum est medicamentum illi sua qualitate contrarium: cum morbus suo curetur cōtrario, sanitas vero suo simili seruetur. At mēsurā quantitatis eius iuxta illos duos modos simul cognoscitur, coniectura artificiosa, ex membri natura, magnitudinēque morbi, & ex his quæ sua conuenientia, seu similitudine id significant, quæ quidem sunt maris ac fœminæ differentia, ætates, consuetudo, tempus anni, & regio, & ars, & robur & habitus corporis, atque color. Ad cognitionem autem naturæ membri quatuor sunt cognoscēda, nempe membri temperatura, eiúsque formatio, positus, virésque ipsius, cognita. n. naturalis mēbri temperatura simul cum morbosæ temperaturæ magnitudine, coniectura prorsus cognoscetur quantum quis recedat à suo naturali temperamēto, vt sciatur quonam

CAPVT

nam indigeat vt sibi restituatur, vt gratia exempli: si salubre temperamentū alicuius frigidum fuerit, morbus vero calidus, tūc is à sua temperatura magno distat recessu, magnaq; indigebit refrigeratione, quod si vtrunq; calidū fuerit, exigua refrigeratio satis erit. Ceterum quod ad formationem ipsius particulæ attinet, iam nobis dictum est quot res in se includat: quare recurratur ad eum locū. Hoc tamē te scire licet, aliquod esse membrū quod ex sui formatione habet tam intra se q̃ extra faciles meatus, vnde tenui ac mediocri medicamine excrementū expellitur: aliquod vero aliud non ita se habet: quo fit vt valentius exigat medicamē. Est & aliud fungosū, aliud vero densum. Rarū autem, tenue medicamen desiderat: dēsum vero, validiori indiget. Membra præterea, quæ validius medicamen postulant, sunt, quæ ex neutra parte cavitatem aut intercapedinem habent: minus autem, quæ in altera tantum parte. Præterea minus, quæ in vtraq; parte conceptaculū obtinent, sed sunt densæ astrictæq; substantiæ, vt renes. Minus iterum, quod vtrinq; habet concauitatē, & est raræ substantiæ, vt pulmo. Per situm vero vt nosti intelligimus, vel locū, vel cōsensum. Notitia igitur cōmunicationis membri tūc quidem maxime tibi conducit, cum aliquod medica-

medicamen ad aliquam partē trahere, aut reducere decreueris: veluti causa exēpli, vbi materia in gibbosa parte iecinoris confederit, eā vrina, vbi vero in caua, aluo euacuabimus: quoniam gibbosa epatis pars cū membrīs vrinæ, & eius concaua cum intestinis communicationem habent. Notitia vero loci tripliciter opem fert, primo quidem vicinitate vel distantia ipsius, nā si propinquus fuerit locus, vt stomachus, modica medicamēta ad eū peruenient, in eundemq; agent: sed si remotus, vt pulmo, vis profecto medicamētorū mediocriū remittetur anteq̃ ad eum pertingent, idcirco multo valētiora pro eo requirūtur pręsidia.

At si vicina fuerit particula, quā medicamētum pertigerit, tunc tāta debet esse vis illius medicamēti, quāta morbo sit opposita. Sed si situs lōgius absit, ita vt si id medicamentū cōpenetrare debeat, magnā vim penetratiuā requirat, tūc plus equo vim medicamēti augere oportebit, vt in emplastro coxendicis, & ceteris alijs id genus fieri solet. Secundo vero, notitia eorū quę admisceri debent medicamētis, vt cito ad membrum perueniāt: veluti in medicamentis membrorū vrinæ, admiscētur quę vrinā cient: in cordialibus vero, crocus. Tertio denique, vt sciatur quomodo ipsi mēbro ad mouendum sit medicamen, vt gratia exempli,

CAPVT

exempli, si vlcus in inferiorib⁹ intestinis insidere scierimus, tum illud clysteri pertingimus: quòd si in supremis id esse coniecerimus, tunc per ea quæ bibuntur.

Nonnunquam adhuc obseruare locū & consensum simul summopere cōducet, veluti cū materia iam perfecte fluxerit ad membrum, quid nā agere nos cōuenit, vbi vero materia adhuc fluit, quid iterū nos agere deceat, nam si adhuc fluat, eā à suo auertemus loco, quatuor tamē cōditionibus prius consideratis.

Prima est ad partem oppositā auersio, quam ἀντίστροφον Græci dicunt, vt cum ex dextra ad leuam reuellimus partem, sursumque ab his quæ infra sunt & contra.

Secundo, si consensum seruaueris, vt mensibus confertim erumpentibus, eos quidem sistes, si magnas cucurbitas sub mammis defixeris tāquam ad affinem locum reuocans.

Tertio, pars è regione sita inspicienda est, vt cum in iecinoris affectibus venā brachij dextri internam (quam basilicam appellant) incidimus: in lienis vero, sinistram.

Quarto, distantia animaduertenda est, ne ad locū nimis vicinum reuocemus. At cū materia iam fluxerit, vtrūq; horū conducit: nempe quia ab ipso membro eam excipimus, aut ad vicinam sociamq; particulam reuocamus,
& ab

& ab illa eam extrahimus, veluti in affectibus vteri venam malleoli (saphenam vocat) incidimus, eam vero quę sub lingua est in affectibus vtriusque tonsillę, seu glādulę gutturis, quas duas amigdalas vocant.

At cum ad contrarium locum reuellere desideras, primo quidem dolorem illius particulę, a qua retrahitur mitiga, animaduertęque ne transitus fiat per membrum nobile. Notitia pręterea virium membri tripliciter confert. Primo quidem inspicere oportet, an nobile sit & princeps, nā in his non debemus vti quoad fieri potest fortibus medicaminibus, quoniam vniuersum lederemus corpus. Nec quod ex cerebro aut epate euacuare oportet haudquaquā semel euacuabimus, neq; vehementer omnino infrigidabimus. Porro cum medicamina dissoluentia epati emplastris superimponere velimus, nequaquam talia apponamus nisi admixtis secum adstringentibus odoratis, vt virtus custodiatur, itidem agendum est in his quę potu ad id damus. Cor vero inter cętera membra maxime obseruandum, quod ad hoc attinet mox cerebrum, deinde epar.

Secundo, membrum quod habet commune officium animaduersione dignū est, & si non sit principale, vt ventriculus & pulmo. idcirco ven-

CAPVT

co ventriculo existenti imbecilli in feb. vere non licet aquam valde frigidam potu dare. Nec te latere velim, quòd apponere super mēbra principalia, & quæ eis vicina sunt, medicamina exquisitè molliētia magnum periculum vitæ afferat. Tertio sensus acumen eiusq̃ hebetudo haud quaquam negligēda est. nam apponere medicamenta vitiosę qualitatis & mordicātia atq̃ nocua, vt elateria & id genus alia, super membra neruea, quæ sensus acumē habent, cauendum. Tria adhuc sunt genera medicamentorum à quibus abstinendum est, nempe vel quę dissoluūt, vel quę extreme infrigidant, vel quæ oppositas habent qualitates, vt erugo æris, & cerusa, & plumbum, & æs vstum, & his similia. Hæc inquam est distinctio medicamenti assumpti ex natura mēbri. Ad magnitudinem autem morbi reuertendum est. Quicūque igitur gratia exempli, calorem morbosum sui corporis habuerit, extinguere quidem debet frigidiori medicamento. Si vero frigiditas accidentalis eius valida fuerit, calidiori medicamēto calefacere oportebit, quòd si neutrū eorum validum fuerit, sufficit nobis medicamentum minus validū. Id vero quod ad tempus morbi attinet scire licet, in quonam temporum morbus sit, vt exempli causa, si abscessus fuerit in suo principio

Pr^o, admouenda sunt quæ repellant tantum:
1^e d si vigore suo constiterit, quæ tantum dis-
soluât. In medio autem istorum temporum,
permiscenda hæc sunt. Quod si morbus
acutus inter initia fuerit, tunc modice regi-
men attenuabimus. In consistentia vero, ex-
treme victus attenuandus est. At si morbus
diuturnior fuerit, tum tenui victu initiò non
utemur. Apud statum vero, modico victu
vti licet, & si complures morbi diuturni præ-
ter febres, victu tenui soluantur. Itidem cum
materia ægritudinis multa fuerit, eiusq; ca-
lidity multa, tunc in principio euacuare con-
uenit, nec cōcoctionem expectabimus, quòd
si mediocris fuerit, concoquere ac euacuare
conueniet. Indicia autem à rerum conueni-
entia seu similitudine sumpta, facile pote-
ris cognoscere, ex quarum genere est aër, qui
quidem maxime considerandus est, curatio-
ni ne an morbo vim afferat. Porro ægri-
tudines periculosæ in quibus si debita vta-
mur mora, ac minoratione seu alleuatione,
nec adhuc sumus in tuto de virtutis deliquio,
tunc primo à forti curatione incipere con-
sentaneum esse dicimus. Quod si nullum est
in eis periculum, tunc sensim ad fortio-
rem procedendum est, si leuior non suffecerit.
Caue præterea ne ab eo quod conuenit age-
re

CAPVT

re declines, quanuis impressio tardauerit. Ne persistas in errore aliquo, & si eius nocumentum non apparuerit. Nihilominus nō permanas in vnico remedio in eadē curatione, sed ad aliud pertranseas, quoniam corpus nō afficitur à re consueta. Quodlibet præterea corpus, quodlibetq; membrum, immo idem corpus ideinq; membrum, in diuersis temporibus proprietatē habet, vt possit ab aliquo remedio affici, ab aliquo vero non. Cūq; ignoraueris morbum, committe eum naturæ. nec præcipitanter agas, quoniam vel ipsa natura morbum euincet, vel monstrabit.

Cæterum vbi morbus coniunctus fuerit dolori aut causæ doloris vel inferenti dolorem, vt est vulnus vel casus, tunc à mitigantibus dolorem inchoandum est. Et cum vsu soporificorum indigueris, ne pertranseas quale est papauer, cū hoc enim quod soporificam vim habet familiare est, quòd si ex vchemēti sensu mēbri lædatur, alatur his quæ sanguinem multo crassiorē reddunt, vt frumentū coctū.

At si infrigidationē non verearis, cibetur rebus frigidis, vt est lactuca & id genus alia.

Porro scias quòd inter cætera remedia optimū est recurrere ad id quod vires tū animales tū vitales validas reddat, vt est lætitia & occurfus rei gratæ : & iugiter vti his quibus
gaudio

gaudio afficitur, immo fortasse iuuabit assidua cōsuetudo cū viris præstātissimis, & cum his quos reueretur, prohibet enim egrotum à rebus quæ nocent ei. Proximum autē huic generi remediorum est transferri de regione in regionem, & de aëre in aërem, & de habitibus in alios habitus transmutari, & omni vti conatu vt habitus atque motus exerceat, quibus membrum æquetur, aut alicui temperamento restituatur, vt cum cogimus puerum strabum inspicere oblique in rem splēdidam, & qui habet torturam faciei, inspicere speculum chalybis: sic enim faciem suam æquare conabitur, atq; oculos, ita vt fortasse tali solertia, reducetur ad correctionem.

Inter cætera præterea quātum poteris cauere debes, ne remedijs vehementibus tempore non commodo, veluti ne magna solutione alui, vel vomitu & abscessuum apertione & vstione, quam καυτήριον Græci vocant, tempore æstatis & hyemis utaris. Id vero quod in curationibus eximiam requirit considerationē, est vbi in eodem morbo duo concurrunt quæ contraria exigant, vt si gratia exempli, ipsa ægritudo aliquid exigat, cuius cōtrarium tamen eius causa expetit, vt est ipsa febris pituitosa, hæc enim ratione sui caloris refrigerationem, ratione vero materiæ, quæ est causa
b feb. cale-

CAPVT

feb, calefactionem desiderat, & contra, itidem vbi morbus calefactionē, & eius accidens in-
frigidationē postulat, vt materia doloris in-
testini coli, quæ quidē calefaciētia, aut discu-
tientia, vel attenuantia exposcit, vehemēs ta-
men dolor eius refrigerātia & soporifera re-
quirit, & contra, Cæterum te latere non licet,
quòd nō quælibet repletio, neq; quælibet ma-
la temperatura curatur per contrariū, videli-
cet per euacuationē & per contrariationē, seu
per oppositam alterationē, quoniam sæpissi-
me vsus optimi regiminis, ad repletionem &
malam temperaturam adhibiti satis sufficit.

Fen quartæ caput secundum, de medicatione
ægritudinum ex malo temperamēto ortarum.



SI mala tēperatura sine materia fue-
rit, tunc ipsum temperamentū per-
mutare tantū debemus, sed si cū ma-
teria fuerit, euacuabimus quidē: &
fortasse sola euacuatio satis erit, vbi nulla ma-
la temperatura ex ipsa materia, ob eius præ-
cedentem infixionē, relictā fuerit, fortasse ta-
men id non erit satis, vbi vitiosa temperatu-
ra relictā fuerit: immo peractā euacuatione tē-
peramentum mutare oportebit. Ad hæc di-
camus quòd mala temperatura varijs cura-
tur modis. nempe hæc vel erit iam infixa, &
tum

tum eius cura fiet per cōtrarium absolute, & hæc est absoluta medicatio, vel erit in fieri, quam quidem corrigit ipsa medicatio facta cum præseruatione. Vt gratia exempli, absoluta medicatio est curare putredinem febris quartanæ medicamento, quod ex viperis conficitur, theriacem vocant, & tertiana potu aque frigide, vt flaua extinguatur bilis, & præcautio est vt in quartana veratro, in tertiana scamonio purges, cum per id, principium futuræ accessionis vitare intendimus. Cūque de aliqua ægritudine ambigis, vtrū eius causa fuerit caliditas vel frigiditas, & cupis id experiri, nequaquam experiaris re modū excedēte, & aduerte ne impressio per accidēs facta te decipiat. Scias quoque quod æquale est tempus, quo fit infrigidatio & calefactio. verum maior est timor infrigidationis: quia calor est naturæ amicus, in humectatione tamē & exiccatione æqualis est timor. verum ipsa humectatio longius exposcit tempus. humidum autem & siccum vtrumque eorum conseruatur à sua validissima causa: permutatur vero à vehementi causa sui cōtrarij. & calidum quidem adaugetur illis causis, quarum mētio iā à nobis plene facta est. deinceps quæ excrementa, & repletionē tollūt, & quæ obstructiones recludunt, mox ex eo, quod ipsum cōser-

b ij uat: quod

CAPVT

uat, quod quidem est humidum equale, frigidum vero validius redditur ob eius validas causas, & ob caloris suffocationem, & per id, quod ipsum vehementer dissoluit: quod quidem est ipsa siccitas per se, & caliditas per accidens.

Quicumque autem exuperantem calorem aperientibus remedijs curare velit, ab immodica infrigidatione caueat, ne inlapidescentem facultatem, & opilationem addat, ab immoderata quoque calefactione abstinere debet: quoniam malam temperaturam calidam augeret: sed sensim procedere debet, & primoque detergant, ad id quod infrigidari debet. Si aqua ordeï & aqua endiuie sufficiat, bene est, sed si id non satis sit, tunc mediocria administranda sunt. Quod si ne hæc quidem satisfacciant, vtendum est his quæ tenuem habent calorem, intrepideque id agere potes, quoniam maius est iuuamentum infrigidationis, quod sequitur ex apertione eorum, quam nocumentum supercalefactionis ipsorum, quæ quidem facile poterit extinguï post reclusionem. Immoderata autem extinctio coctionem acrium humorum vetat, etsi nonnulli huic aduersentur sententiae, cum ignorent immodicam extinctionem vires deicere, & praesertim quæ per ægritudinem imbecilliores effectæ sunt, & quæ materia summo opere corrigatur, quandoque tamē relinquuntur post

tur post eam ægri tudines, quæ ex mala tempera-
tura frigida immateriali pendent, aut
cum materia contraria illi temperaturæ quæ
correcta fuit. Porro frigida tēperatura cū
iam infixa fuerit, videtur quoquo modo esse
difficilis calefactionis, in principio vero est
admodum facile. verū infrigidare summe ca-
lidam, & si sit difficile, facilius tamen est q̄ ca-
lescere extreme frigidā. Quoniam extrema
frigiditas est ipsa mors nature, eiꝫ æquatur.
Scias præterea quòd infrigidatio quādoqꝫ ad-
iungitur siccitati, & quādoqꝫ humiditati, nō-
nunqꝫ vero est expers vtriusqꝫ. Exiccatio autē
frigiditatem iam factā fouet, humiditas vero
eam quæ nunc fit magis inducit. nonnunquā
præterea adiuuāt siccitatem omnes causæ ca-
loris quæ in extremo fuerint, & nonnunqꝫ o-
mnes causæ immoderatæ frigiditatis humi-
ditatē adiuuāt, neqꝫ quicqꝫ adeo efficaciter id
efficit, vt ociū & assiduus vsus leniū balneo-
rum & thermarum. Hoc autem totū iam in
prioribus sermonibus notum fecimus. Vinū
quoqꝫ dilutū eximiā habet vim humectandi.
Scire adhuc debes quòd cū senex indiget re-
frigeratione & humectatiōe, ad id nō est suf-
ficiens id quod ad temperiē eum deducat, im-
mo quod ad eius frigidam & humidā tempe-
raturam in quā incidit transeat, & si sit ei ac-
cidenta-

CAPVT

cidētalīs, est veluti naturalis. Nec te lateat quòd sēpissime quādo aliquā temperaturam immutare cupimus, cogimur facere quæ eam validiorē reddant, mixta cum re ei cōtraria, vt cū cogimur vti aceto cū medicamentis calefaciētibus, ob eorum imbecillem vim, propter quam ad aliquā particulā penetrare nequeunt, itidem cogimur vti croco in medicamentis infrigidantibus cor, vt ad ipsum perducatur. Multotiens adhuc aliquod medicamē habet validissimam vim permutādi aliquam temperaturam, sed ob eius tenuitatē nō adeo immoratur vt suum peragat officium: tunc igitur oportet ei admiscere aliquid quod illud crassius reddat, detineatq̃, etsi cōtrarium suę actionis id inferat: vt cū oleo balsamino cerā admiscemus, vel aliud, vt in eo mēbro tantisper detineatur dū possit fungi officio suo.

Caput tertium sen quartæ: Quomodo & quando fieri debeat euacuatio.

Decem sunt ea quæ rectum adferunt iudicium de euacuatione faciendā: nempe repletio, vires, temperatura, habitudines corporis, & accidentia concurrentia, velut ne illi, quem soluere vis, acciderit iam solutio alui: quoniā in alui profluuio aluū soluere periculosum est. ad hæc
ætates

ætates & tēpus anni, & aëris constitutio, & regiones & cōsuetudo in euacuatione, & exercitia seu artes. Hæc inq̃ si contrariū affirmandæ euacuationis indicent, euacuationē quidē prohibebunt. Vacuitas nanq; euacuationem omnino prohibet. Itidem & imbecillitas: cuius vis trium facultatum. Verum quandoque præeligimus debilitatē alicuius virtutis, potius q̃ nocumentum quod sequi posset ex dimissione euacuationis, hoc autem in facultatibus sensus & motus, si confidamus rem periculofam corrigi posse cum acciderit, itidē & in cunctis facultatibus fieri debet. Temperatura præterea calida & sicca euacuationem prohibet. Itidem frigida & humida, quæ caloris est expers, vel imbecillem habet calorem, euacuationem vetat. Calida vero & humida eam satis admittit. Habitus autē corporis idem facit. nam immoderata macilētia & raritas corporis, eam impedit timore dissolutionis virtutis, & ideo cū rexeris aliquem imbecillum macilentum, qui multam flauā bilem in sanguine habeat, debes ipsi ea exhibere remedia, quæ vrinā multiplicent, & nō euacuare ipsum: cibabisq; eum his quæ optimū sanguinem generant, ad frigidum & humidū declinantia. Sic enim fortasse temperamentum humoris eius corriges. Immo forte ro-
bora-

CAPVT

borabis ipsum, & tūc euacuationes tolerabit. Itidem neq; sis præceps in ægro euacuando, qui ex vsu habet parum comedere, si euacuationem euitare potes. Et qui supra modū obesus, prohibebis quoq; ab euacuatione, timēs tum ne frigiditas præualeat, tum etiā ne caro venas opprimat, easq; inanitas claudat & suffocetur natiuus calor, aut ad viscera excrementa exprimat. Accidentia quoq; mala vt prōptitudo ad alui profluuiū (quod *διάρρεια* vocant) & conuulsio, euacuationem vetant, & ætates inferiores integro incremēto, & quæ ad terminum vltimi senij deuenerint. Tempus quoq; æstiuum & supra modum frigidū, eam non admittunt. Regio ad hæc meridionalis admodum calida satis ei obstat, cū maior pars medicaminum soluētium sit calida, coniūctio autem duorum calorum intolerabilis est. Adde etiam quòd vires sunt imbecilles, & laxæ, & calor exterior trahit ad se humorem foras, medicamentū vero intrò: & sic validus accidet tract⁹ qui ad pugnam ducet. Septentrionalis quoq; regio frigida eadem vetat, & qui parum est assuetus euacuari, ab euacuatione etiam prohibendus est. Itidem & qui habent exercitia in quibus magna fieri solet euacuatio, vt qui balneis subministrant, & qui onera ferunt, & tandem in quolibet exercitio

exercitio laborioso abstinendum est ab euacuatione. Porro scire debes quòd ex qualibet euacuatione quinque desiderantur. Primum quidem, vt id quod euacuari debet euacuetur, post quam prorsus euacuationem allevatio subsequatur, non lassitudo instrumentorum, aut caloris irritatio aut feb. diaria: id est ephemera, vel aliquis alius morbus qui subsequi solet, vt intestinorum abrasio per alui solutionem, & vlcera vesicæ per urinæ euacuationem, nam etsi id iuuerit, eius iuumentum non percipietur, immo fortasse statim nocebit, donec accidens remoueatur. Secundo inspiciendum est, quò tendat, quoniã nausea vomitu purgatur, & dolor ventris per alui deiectionem. Tertio, vt origo membri sit in ea parte ad quam vergit. sicut se habet interna vena dextri brachij ad iecinoris affectus, non autem capitalis dextra que cephalica nuncupatur. Nam si in similibus errorẽ comiserit, noxam afferet. Membrum autem per quod educitur, ignobilius esse debet eo. à quo vacuatio fit, ne humor ad nobilius tēdat, per exitumq; sibi naturalem id fieri debet, vt se habent mēbra urinaria ad gibbum epatis, & intestina ad eius concauum. Præterea membrum per quod fit expulsio, quandoq; est ipsummet membrum, à quo euacuatio faciēda

CAPVT

ciēda est. Sed si in eo fuerit aliquis diuturnus affectus, vel aliqua recens ægritudo, timendūq; esset ne humores super ipsum transirēt, tunc oportebit eos alió deriuare quod sit cōuenientius. immo quandoq; veremur ne prædominio humoris in eo ægritudinem pariat: vt si ab oculo ad guttur repellatur, fortasse enim in tumorē anginae nos dūcet. Quo circa in similibus sensim procedendū est, immo ipsa natura quandoq; simili fungitur officio, & euacuat per infuetā partem, cum custodire curet illud membrum quādo est imbecille, & aliquando id quod natura euacuat à remota oppositaq; parte ambiguitatem affert: vt si à capite ad aluum aut crus & plantam pedis, id expellatur, nam vtrum ab vniuerso membro aut ab aliquo eius sinu id fiat, nō verè scitur. Tempus euacuationis considerare oportet. & Gal. adhuc dicit, quòd in diuturnis morbis expectanda est concoctio, non in alijs. Quid autem sit concoctio, iam nosti. Post concoctionem autem ante euacuationem exhibenda sunt attenuantia, veluti aqua hyssopi, aut satureiæ, & semina. Verum in acutis quoq; morbis, & præsertim quietis, consentaneum est coctionem expectare. Sed si mobiles fuerint, tunc cōuenientius est euacuationem materiæ accelerare: quoniam læsio quæ
ab eius

ab eius motu prouenit, longe maior est quàm quæ ab euacuatione ante cōcoctionē, præcipue vbi humores fuerint tenues, & maxime si in capacitatibus venarum fuerint, & non ingrediantur membra. At si in aliqua particula humor fuerit detentus, haudquaquam moueatur donec concoctus fuerit, & medio-crem substantiā adeptus: vt ex locis proprijs iam nosti. Itidem si non fidamus virtutem sustētari vsque ad tempus concoctionis, euacuabimus quidem eum humorem, prius tamē cognita eius tenuitate & crassicie. Quod si crassius & densus fuerit, nequaquā eum moueas, nisi prius ipsum attenuaueris. Indicat autem ipsam crassitudinem nausea quæ præcessit, & dolor tensius sub precordijs, & ortus apostematum in visceribus. Maxime autem animaduertendum est in hac re, ne exigui meatus sint obstructi: & post hæc omnia poteris aluum soluere ante concoctionem. Quinto vero contemplanda est quātitas rei quæ euacuatur, quod quidem ad cōsiderationem quantitatis materię virtutisq; atq; accidentium quæ post euacuationem remanent attinet, quoniam si accidens aliquod euacuationem sequatur, minus euacuabimus de eo quod euacuare pposuimus, nisi sperauerimus succurrere illi accidenti quod euacuationem subsequitur,

CAPVT

subsequitur, vt in conuulsione ex repletionē fieri solet. Scias adhuc quòd dupliciter materia euacuatur eradicaturq; à suo loco, vel enim per reuulsum ad contrariam remotamq; , vel per deriuatum ad contrariam proximamq; particulam. Conuenientius tamen tempus, quo id fieri debet, est, dum nulla est in corpore repletio, neq; humorum redundātia vlllo pacto. Subijciatur igitur vt à supremis partibus oris alicuius viri immodice sanguis profluxerit, vel ab hæmorroidib⁹ alicuius mulieris, immoderata sanguinis copia effluxerit, cogimur omnino aut ad partem vicinam oppositam reducere, & tunc recte reuocabitur materia, in primo quidem exemplo ad nares, in secundo vero ad locos, menses reuocando. At si ad remotam partem oppositam reuellere cupimus, tunc in primo exemplo per infernas. In secundo vero per supernas venas, & corporis particulas sanguinem euacuabimus, & cum ad remotam partem fit auersio, non debet per duas diametros remoueri, sed tantum per vnam diametrum quæ longinquior sit. nam si materia in supremis partibus dextri corporis fuerit, nequaquā ad infernas sinistri reuocabis, immo ad eiusdē dextri infernas partes retrahes, quod profecto conuenientius est, aut ad sinistras supremas,

si

si tanta fuerit distantia, quanta inter flexurā & flexuram, dummodo res non sit vt in duabus capitis partibus. Nam si in dextra capitis parte materia infederit, ad infernam non ad sinistram capitis partem trahes. Cæterum cū ad locum remotum materiam reuellere intēdis, mitiga prius dolorē loci affecti, sic enim minor fiet tractionis violentia, cum dolor ipse trahat. At cum grauitur trahitur ad locū, ad quem trahere cupis, non properes impotune, fortasse enim huiusmodi vrgens infestatio mouebit materiam, eamq; attenuabit, & non trahetur, immo ad affectum locum facilius reuocabitur. Nonnunquam præterea satis erit tibi retrahere, & si eam non euacues, quoniam ipsa retractio prohibet materiam cōuerti ad membrum, quanuis non extrahat eam. Sola enim auersio ipsa fungitur officio proposito, etsi ea nihil euacues, immo sufficiet tibi si vsus fueris deuinctione oppositorum membrorum, cucurbitularumq; defixione, aut medicamentis quæ rubificantia vocant: & vt summatim dicā, quibus suis dolorem inferentibus remedijs. Materiæ rursus quæ facilius vacuantur, sunt quæ in venis existunt, moxq; in membris, & artubus. Maxima nanque cum difficultate ex his extrahi atque euacuari possunt, nec fieri potest quin cum illis

CAPVT

illis aliquid aliud euacuetur. Ad hæc qui euacuatus est, nō debet festinare ad cibos multos ac crudos capiendos : quoniam natura eos incoctos trahet, quòd si aliqua vi cogimur id facere, id quidem sensim ac paulatim fiat, adeo vt ordinate res procedat, & quod corpus ingreditur sit optime concoctum. Porro venę sectio, est humorum æque auctorum propria euacuatio. Sed propria euacuatio, quæ debetur humori sua quantitate tantum exuperati, aut sua qualitate corrupto, est aliud à venę sectione. Omnis præterea euacuatio immoderata, solet, vt plurimum, feb. inducere. Cumq; ex detentione alicuius fluxionis consuetę aliquis malus subsequatur affectus, eandem reuocare euacuationem, curatio vt plurimum est : vt si auriū fordis aut narium mucci detentio vertiginem induxerit, proculdubio eorum eductio eam tollet. Nec te lateat, quòd minus nocet relinquere aliquod residuum humoris, qui euacuatione indiget, quàm exquisite eum euacuare, vel ægrum eo perducere, vt vires debilitentur : quoniam ipsa natura tale residuum sepiissime soluere solet. Et vbi humor in genere perseuerauerit conuenienti, agrotansque eum bene fert, ne timeas exuperantiam, & fortasse eris coactus euacuare vsque ad animi deliquium. Et si quis

quis vires validas habeat, materia tamen humorum vitiosorum eius admodum exuperans fuerit, vberrimè euacuari potest. Sed qui vires imbecillas habet, humorumque malorum eius materia multa fuerit, tunc sensim eum euacuare oportet. Itidem si materia valde hæreat, aut cum sanguine valide mixta fuerit, is semel euacuari nequit: vt fit in coxèdice & in articulorum doloribus diuturnis, & cancro, inueteratâque scabie, diuturnisque tuberculis. Scias præterea quòd alui solutio trahit à partibus superioribus, & eradicat ab inferioribus. Expedit igitur vtrique tractui conuenienti videlicet & opposito, conuenit adhuc & post materierum quietem. Et cum materiæ in superioribus partibus fuerint, ad oppositum trahit, & à loco vbi sunt, eas euellit. Vomitus vero, & attractione & euulsionem opposito modo efficit. Venæ sectio vero, variè se habet iuxta loci varietatem vbi sanguis existit, vt iam nosti. Ille præterea minus euacuatione indiget, qui optimo vititur nutrimento, optimèque concoquit, & qui regiones inhabitant calidas.

Caput quartum seu quartè, de regulis quæ vomitui & alui solutioni sunt còmunes, de quò modo quo vomituum solutiuumque trahant.

Si quis

CAPVT

SI quis alui solutione, vel vomitu vti desiderat, debet suum dispartiri cibum, & quantum vno die sufficit ei, bis idem resumat, varietq; cibaria portionesq; . fiet enim ex hoc vt ventriculus, si quid in se continet, id susq; deq; expellere cupiat. At si cibus nec varius neque super aliū appositus fuerit, ventriculus profecto eum tenaciter retinet, eumq; custodit, vehementerq; eum amplectitur, præsertim si exigua fuerit quantitatis. Qui vero lenem habet aluū, nullum horum agere debet. Nec te lateat, quod qui bono vtitur regimine, non contingit eum indigere vomitu, vel alui solutione, vel alijs similibus. Nam bonum regimē aliquid aliud his leuius desiderat. Immo forte si quis diligens fuerit in hac re, sufficiet ei deambulatio & frictio & balnea. Quod si ei⁹ corpus repletum fuerit, profecto huiusmodi viri repletio, vt plurimū ex optimo humore erit, hoc est, ex sanguine. Huic ergo venæ sectio magis necessaria est pro eius purgatione, nō alui solutio. Porrò vbi necessitas non cogit venam incidere, & aluum soluere, velut cum veratro & alijs fortibus medicamentis, tunc à sanguinis missione inchoandum est. hoc enim est Hip. præceptum in li. de morbis passim grassantibus, & est profecto verum. Itidem si cum sanguine

sanguine pituitosi humores immixti fuerint, quibus fortasse venæ sectio crassiciem & lentorem addiderit, tūc ab alui solutione inchoandum est, & vt summam dicam, cum humores æquales fuerint, præpone phlebotomiā, deinde euacua. Sed si inæquales, euacua prius excrementum donec æquētur, deinde venam incide. Ad hæc vbi præponenda est sanguinis missio, & aliquis pharmacum præmiserit, paucis diebus expectare debet. At cui recens vena secta fuerit, & euacuatione indiguerit, exhibere ei pharmacum conuenientius erit. Multoties vero exhibere pharmacum, vbi venæ sectio cōueniret, febrem vnā cum perturbatione introducit, quæ quidem si adhibitis remedijs sedatiuis non sedetur, tunc nō ignorabis fuisse necessarium præponere sanguinis missionem. Nec requiritur quælibet euacuatione, ob immoderatā repletionem, immo quandoque affectus magnitudo repletioq; secundum qualitatem non secundum quantitatem eā exposcit. Sæpissime adhuc aliqua necessitas cogit euacuatione vti, & aliquid eam prohibet, nullōque alio ingenio vti potest q̄ inedia & somno atque correctione temperaturæ quam repletio inducit. Ceterum aliqua est euacuatio qua in præcautionem vtimur: vt est illa qua indiget is, qui podagra & comi-

c tiali

CAPVT

tiali morbo, vel alijs corripī certo tempore solet, & præsertim tempore veris. Tunc ergo ante illud tempus debet se præparare, & euacuatione suæ ægritudini propria vti, siue sanguinis detractiōe, siue pharmacia, & fortasse administratio exiccantiū exterius, & exiccatiua medicamina aliquo euacuationis officio funguntur, vt his qui aqua inter cutem laborant, administrari solent. Nonnunquam præterea oportet te vti medicamento simili in qualitate humori euacuando, vt scamonio, cum flauam bilem euacuare cogaris. Tunc igitur ei admisceri debet id quod sua qualitate ei obstat, & vt in solutione conueniat, vel quod non prohibeat eius solutionem, vt sunt mirobalani, malāmque temperaturam si quæ orta fuerit ab eo, post illud corrigat. Porro qui viscerum seu stomachi ac intestinorum apostematibus laborant, moleste ferunt solutionem & vomitum. Quod si hoc indigeant, da eis lupulos, & cartamum, & aquam polipodij, & cassiam fistulam, & his similia. inquit Hip. macilentos & ad vomitum faciles, purgandos esse per vomitū, hoc autem fiat æstate, vere, autumno, nō hieme. Sed qui mediocriter carnosus fuerit, conuenientius est eum per inferiora purgare. Quod si res urgeat vt vomitu euacuemus, ad æstatem differre debe-

ferre debemus. Cauendūque est ab eo, nisi
vbi magnavrgreat necessitas. Attenuatio præ-
terea humoris quem euacuare volumus, solu-
tioni ac vomitui præponenda est. Itidem &
meatum dilatatio, reclusioq; hoc enim fidi-
mus, corpus nullum laborem esse passurum.
Cæterum scire debes quòd assuescere natu-
ram, vt reddatur lenis & facilis, ad id quod cu-
pis, videlicet ad vētris solutionem, vel vomiti-
um, anteq̃ exhibeatur solutium, vel vomiti-
um, est regimen prosperum. Ad hæc ven-
tris purgatio atq; vomitus, vbi gracilitas vē-
tris adsit, difficilis quidem ac laboriosa & pe-
riculosa. Porro vomitium medicamentum
efficitur solutium, cum ventriculus vali-
dam habuerit vim, aut vbi post vehementem
famem exhibitum fuerit: vel si ille cui exhi-
bitū est solutus sit, vel natura lenis, aut ad vo-
mitū insuetus, aut quod illud medicamentū
sit grauis substantiæ, facile descendens. Solu-
tium vero redditur vomitiū, ob stomachi
imbecillitatem, aut immoderatā excrementi
alui ficationem, aut quia medicamentū id ab-
ominabile est, aut qui illud sumpserit nausēā
patiatur. Cūq; aliquod solutiuū medicamen-
tum nihil vel aliquid incoctū soluerit, humo-
rem soluēdum mouet, & eum per corpus di-
spergit, corporique dominatur, & alij humo-
res in

CAPVT

res in eum conuertuntur, & talis humor in corpore multiplicatur. Est præterea in corpore aliquis humor qui facile vomitui consentit, vt plurimū, sicut flaua bilis: aliquis vero cum difficultate, vt atra bilis: quidam vtrūq; habet, vt pituita. Ad hæc febriens alui purgatione potius q̄ vomitu vti debet. qui autem humorem habet deorsum descendente, vt qui leuitate intestinorum, quam lenteriam dicunt, laborat, prohibitus est ei vomitus. Porro inter cætera medicamina soluentia illud certe deterius est, quod tempore solutionis ex medicamentis maxime diuersis constat, quoniam solutio perturbatur, & primum antequā secundum soluet, & forte primum substantiā secundi soluet. Quicumque præterea solutioni alui vel vomitui se committit, cum purū habeat corpus, impossibile est, quin & capitis vertiginem, ventrisque tormina atq; inquietudinē patiatur, & quicquid euacuabitur ab eo, id prorsus maxima cum difficultate purgabitur. & vt vnico verbo dicam, quotiescunque solutiū medicamentum excrementa expurgat, nullam consequitur ipsum perturbatio. Sed cum incoeperit perturbatio, id profecto aliquid aliud quā excrementū euacuat. Cumq; humor, qui per vomitum vel aluum euacuandus est, in alium conuertatur humorē,

humorem, corpus profecto indicat esse expurgatum ex illo humore, quē euacuare desideramus. Sed si in abrasione, & quid nigrū foetidū vertatur, tunc malo est. Præterea vbi somnus post solutionem inualuerit, significat corpus esse exacte purgatū per talem euacuationem, & contulisse. Nec te lateat, quod si post solutionem vel vomitū sitis inualuerit, quod perfectam ac exquisitam optimāq; purgationem significat. Scias adhuc quod solutium medicamen soluit vi tractiua, qua ipsum & humorem trahit, & fortasse trahit crassum humorem & tenuē relinquit, vt quod atram bilem soluit efficere solet, nec recte locutus est, qui dixit illud medicamen generare id qđ trahit, vel quod tenuius primo trahat. Tāetsi Gale, sententia hæc sit, absolute tamē dicit, quod illud solutium, quod nullam habet beneficam vim, si non soluerit sed in nutrimentum conuertatur, generat humorem quem trahit, sed hæc sententia non est omnino probanda. Verum, vt ex sententia Gal, colligi potest, videtur ipse censere quod inter medicamētum trahens, & humorem tractū sit quædam similitudo in substantia, & ideo trahit, quæ quidē sententia non videtur veritati conformis. Nam si tractio fieret per similitudinem, ferrum certe ferrum traheret quando illi dominaretur,

c iiij naretur,

CAPVT

naretur, & aurum itidem aurum attraheret, ubi sua quātitate illi præualeret. Veruntamē huius inquisitionis finis, ad alium q̄ ad medicum pertinet. Secundū adhuc est quod attractio humorum, quæ fit per potionem solutiui medicaminis, vel vomitiui, per easdē fit vias, per quas pulsi fuerūt, donec ad intestina & ventriculum perueniant, ibiq; natura mouetur vt foras propellat. Raro tamen accidit vt per potionem solutiua ascendāt ad stomachum, quod si ascenderint, ad vomitum quidem euocabuntur, duabusq; rationibus nō fit ascensus ad stomachum. Prima, quia solutiuum medicamentum cito penetrat ad intestina. Secūda vero, quia tēpore potionis pharmaci solutiui, natura festinat expellere ex venis, mesaraicis nuncupatis, deorsum non sursum. Est enim id & propinquius atq; facilius. Adde etiam quod subsequētia, ea quæ præcesserunt impellunt, hoc autē maxime mouet naturam ad expulsionem per propinquiorem viam, & si medicamen haberet vim tractiua non coniunctam ipsi humori, tunc vis nature expultricis deberet magis præualere in corpore sano ac robusto. Accedit ad hoc, quia medicamen trahit illum ad propriam viam. At vomitium medicamen contrario modo se habet, nam cū in ventriculo est, inibi moratur

ratur, & humorem trahit ad se ex intestinis, suaq; vi & resistantia naturali virtuti dominatur. Scire adhuc debes quod maior attractio humorum, quæ fit per medicamentorum solutiuorum tractum, est in venis, nisi valde vicinū extiterit: tunc enim ex eo & in venas & non venas humor trahitur, vt in humoribus qui in pulmone sunt fieri solet, hi enim per viciniorē viam trahuntur ad ventriculum & intestina, quanuis non permeent per venas. Itē scias quod sæpissime exiccatio quæ fit cum medicamentis exiccantibus, est causa euacuationis humiditatum à corpore, vt in aqua inter cutem fieri solet.

Caput quintū sen quartæ, sermo de purgatione & eius regulis.



Am ante à nobis traditū est, oportere corpus præparare ad recipiendum solutium medicamen, antequam exhibeatur, amplificatiōe meatuum, lenitioneq; alui, & præsertim in frigidis affectibus, & vt summatim dicam, ante ventris solutionem lubricum facere est optima regula, in qua maxima fiducia habēda est, præterquā in his qui admodum parati sunt ad alui fluxum. In his enim nihil tale agendū est, quoniam immodici profluuij periculum esset.

c iiij Horum

CAPVT

Horum ergo solutiuo medicamini admiscen-
 dum est aliquod vomitiuū, ne festinet descen-
 dere à vētriculo anteq̃ perficiat officium su-
 um, immo equetur in eo vis vtriusq̃ medica-
 minis, & solutium agat suam actionem, vo-
 mitiumq̃ suo fungatur officio illi opposito.
 Cæterū balbutientes sunt fluxui ventris ex-
 positissimi, ideoq̃ fortissimū medicamen so-
 lutiū non ferunt, & vt plurimum eorū solu-
 tio prouenit ex fluxionib⁹ capitis. Periculo-
 sum præterea est sumere pharmacum soluti-
 uum manentibus siccis excrementis in inte-
 stinis, sed debent prius educi siue clystere siue
 aliquo lenitiuo iure. Vti etiā balneo ante so-
 lutiui pharmaci potionē per aliquot dies, est
 ex præparatiuis remedijs præsentaneis, nisi
 aliquid impedierit. Sed inter balnea & phar-
 maci potionem exiguū debet interesse inter-
 uallū, nec post pharmaci haustum debet bal-
 neum ingredi, quoniam materiam ad exte-
 riora euocat. Cōueniret tamen vbi alui flu-
 xionem sistere curaremus. Sed hieme nihil
 inconuenit primam domum balnei ingredi,
 vbi eius calor haudquaquam possit trahere,
 sed lenire. & vt verbo dicam, aer, vbi versa-
 tur qui pharmacum sumpserit, ad exiguam
 caliditatem declinare debet, ne sudet neque
 molestia afficiatur, hoc enim inter ea quæ
 præparant

preparant numeratur. Itidem & frictio & inunctio ex oleo præparatum est remedium. At qui pharmaco non fuerit usus, neque ipsum potauerit, nequaquam debet medicus exhibere ei medicamina vehemēter soluētia. Qui vero repletionē tenentur, humoribusq; glutinosis ac tentione in præcordijs laborāt, & qui in visceribus inflammationem & opilationes habuerint, nulla est eis exhibenda potio, donec id lenientibus alimentis, balneo, otioq; & dimissione rerum quę moueant & inflamment corrigatur. Porro qui aquas stagnales bibūt, ac lienosi, fortia desiderāt pharmaca. Adhæc si quis validū hauserit pharmacum, satius erit post illud dormire antequam operetur, quoniā tunc melius suo fungetur officio. Si vero debile id fuerit, satius erit à sumpto pharmaco non dormire, quoniam natura medicamentum id concoquet. Sed cum pharmacum incipit operari, utcūque fuerit, tutius est non superdormire, neque debet moueri super potionem pharmaci, sed quiescere vt ipsum natura amplectatur agatq; in ipsum, nam nisi in ipsum agat, id in naturam non aget. Odorare tamen debet quæ nauseam prohibent, vt mentam, & rutam, & apium, & citonium, & terram lenniā rosacea aqua respersam, pauco addito aceto.

&

CAPVT

& si ob odorem pharmaci renuat illud haurire, claudat nares. Debet præterea, qui à medicamento abhorret, aliquid tarcon (quod pyrethrum à nonnullis esse creditur) mandere, vt oris facultatem stupidā reddat. Quod si vereatur ne medicamentum euomat, extrema deligere debet, & post potum statim aliquod habens adstringendi vim sumat. Ceterum his quādoq; medici catapotia melle obuoluunt, nonnunquam melle, vel zuccharo decoctis, adeo vt indumento quodam oblinantur. Est quoq; conueniens industria ea cera liniri. Ex industria adhuc est implere os aqua, vel aliquo alio, deinde catapotia, vt sunt, deuorare, aut aliqua alia industria vti, totūq; id ita deglutiat, ne à medicamine quis afficiatur. Decoctum autem debet tepidum potari. Catapotia vero cum aqua tepida deglutire licet. Ad hæc qui pharmacum haurit, ventericulum atq; pedum plātas calefacere debet, & statim ipsum fumere. Sed postquā animus quieuerit, ambulet, ac sensim moueatur, quoniā huiusmodi motus satis iuuat, paulatimq; aquam calidam hauriat: quantitatem tamen, qua nec medicamentū soluat, neq; ipsum educat, eiusq; vim hebetet, nisi vbi vrgeat necessitas fluxionis alui detinendæ. Potu adhuc aquæ calidæ euitamus lēSIONē pharmaci. Præterea

terea qui calidi tēperamenti est, debilisq; cō-
stitutiois, & imbecillis vētriculi, & vult phar-
macum sumere, debet antea bibere quale est
aqua ordeī, vel vinum granatorū : & vt sum-
matim dicā, aliquod alimentū tenue facilisq;
concoctionis ventriculo præponat. At si non
ita se habuerit, satius est vt ieiun⁹ pharmacū
hauriat. Porro qui æstate soluitur, febrem
incurrit. Et qui pharmacum sumpsit, non
debet comedere neq; bibere donec pharmacū
suum perficiet officium, neq; post eius solu-
tionem dormire licet, nisi fluxum sistere vo-
let. Et si eius ventriculus non sustinuerit in-
ediā, eo quòd biliosus sit, facileq; ad eum bilis
confluat, aut quia iā diu præcautione inedia
vſus fuerit, tum debet exhiberi ei panis pau-
co vino maceratus, post pharmacū, ante pur-
gationem, hoc enim fortasse adiuuabit phar-
macum. Nec anum aqua frigida, sed calida
abluere debet. Quidam dixerunt quòd cata-
potia deuorāda sunt cum aliquo decocto eo-
rum naturæ respondente, veluti catapotia
quæ flauam purgant bilem, deuoranda sunt
cum decocto fumiterræ: & quæ atram, cū de-
cocto epithymi & filiculæ, & id genus alijs:
& quæ pituitam educunt, cum decocto cen-
tauri. Cæterum cum aliquod corpus siccum
duram habens carnem aliquo forti medica-
mine

CAPVT

mine euacuare volueris, vt veratro & id genus alijs, valida humectatione prius vtendum est, cibus scilicet pinguibus. Tandem fortia medicamenta purgatiua magnum minitantur periculum, vt est veratrum, corpori nanque integro conuulsionem adfert, plethorici vero corporis humores motu periculo commouet, & simul ad intestina trahit, quod nauseam excitat. Cumq; maximum infertur nocumentum ex potu alicuius lactariæ herbæ venenosi generis, quæ tithymalli vocantur, vt est daphnoides, quam laureolam vocamus, vel pityusa, quam cebrā Mauri appellant, id nocumentum lac acetosum tollit astringitq;. Sæpissime præterea medicamentum dimittit odorē in ventriculo, ita vt videatur ipsummet inibi remansisse, cui remedio quidem est farina ordeï tosta, ob eius deterfionem, nihil enim inter omnia quæ bibuntur melius est. Cumq; iam diu pharmacū sumptum fuerit, nec dum operari cœperit, tum si fieri potest vt ipsum euomat, & nihil moueat, fiat. Sed si aliquid obstat, satius erit trajcere aquam mulsam vel eius syrupum, aut aquam in qua nitrum sit dissolutum, vel glandē supponat aut clysterem infundat. Causæ autem impotentie pharmaci sunt vel meatuū angustia à sua formatiōe, aut ob tēperaturā, aut ex morbi

morbi vicinitate, nam qui resolutione quam paralyfim vocant, & stupore attonito, quem apoplexiā dicunt, capiuntur, astrictos habent meatus, quibus medicamina debent transire ad illorū humores, & ideo illorum solutio imbecillior redditur. Porro duo medicamēta solutiva eodem die porrigere vt metu plenū est, ita alienum à ratione. Quodcunq; etiā pharmacum quod est proprium alicui humori, si eum non inuenerit perturbabit quidem, & cū difficultate soluet. idemq; efficiet si eū in suo contrario immersum inuenerit. Cæterū omne pharmacum soluit primo humorem sibi propriū, deinde eum qui magis exuperat, tenuiorq; est, itidem & reliquos iuxta hunc ordinem, præter sanguinem, quem quidem natura postponit atq; custodit. Attrahere præterea humorem distantē difficile est. Adhuc si quis vereatur ne à pharmaco hausto superueniat ei inquietudo, & nausea, is quidē duobus aut tribus diebus ante pharmaci vsum debet vomitum citare cum decocto radiculae, eiusq; esu. Neque salis copia in edulijs vti debet qui purgationē desiderat. Cæterum sæpissime cū pharmacū non soluit molestiam, nauseā, animi deliquiū, tremorem cordis, torminaq; adfert, aut sordorem, sæpiusq; coguntur ipsum euomere. Quādoq; tamē sufficit sumere quæ
habent

CAPVT

habent vim adstringendi. Potus quoque aque ordeï tollit eius læsionē, detergitque quicquid intestinis adhæret. Et qui frigide est tēperaturæ, cuius humoribus pituita præualet, post pharmaci assumptionem eiusque operationem sumere debet nasturtium, aqua calida elotum cum oleo. At si calidi fuerit tēperamenti, sumat psyllium ex aqua frigida & oleo violaceo & zuccharo albissimo, & Iulep. Sed qui moderatam habet temperaturā, sumat semen lini. & qui abrasionem intestinorum timet, armenia glebam, quam lutum armenum vocant, ex vino granatorum sumat. Porro his enarratis à purgatione vtendum est, ni eam sistere velis. Cæterum si febris quempia à pharmaci potione inuadit, nihil melius aqua ordeacea. Syrupus vero acetosus intestina deradit, postponi ergo debet, in secundum aut tertium diem, donec intestina sibi restituta fuerint. Porro qui purgatus est, balnea debet ingredi die secunda, quoniam si quid relictum fuerit ex humoribus, id balnea dissoluunt. Quod si balneis oblectetur, ac in delitijs habeat, indicio est quod eum à residuo purgabunt itaque sine eum. Quod si scias eum non oblectari illis, sed potius molestari, tū illinc eum auoces. Nec te lateat quod qui ventriculum & intestina imbecilla habet, fortasse ab ipsis medicami-

medicaminibus, quibus vis purgandi inest, facultatem solutiua adipiscetur: talisq; affectus in eo perdurabit, ita vt multis remedijs indigeat quo adstringatur. In senibus quoq; metuendum est de solutiuo & eius nocumentis. Præterea sciendū est quòd bibere aquam fructuū post medicamina purgatiua, febres, perturbationemque inducit. Multoties etiā post purgationem venæq; sectionē remanet dolor in epate, quē potus aquæ calidæ tollit. In ortu etiā canis, atq; in frigoribus maximis, non est purgationibus vtendū. Idcirco satius est vere vel autūno pharmacū sumere: autumnus tamen ei rei aptior est. Hiems autem est tempus, quo nix in montes cadit. Ver autem æstas subsequitur. Ideoq; non sumatur in ea nisi quod tenue, sed autumnus est inæquale tempus. Semper autem non est assuescenda natura ad pharmaca quoties indiget lenitione: quoniā id in vsum conuerteretur, & eius tandem exitus ad perniciem duceret. Pharmacū quoq; fortes vires dissoluit, eiusq; temperamentum habet siccum. Post potionē autem debilis pharmaci parū mouēdū est, ne eius vis dissoluatur. Inter medicamenta debilia benedicta, numerandæ sunt violæ & zuccharum. Et q̄ hieme solutiuo medicamēto indiget, ventum obseruet austrinum, æstate vero septentrionalem.

CAPVT

lem. Aliqui tamen huius contrarium aiunt. Sed id quidem distinguere oportet iuxta varios morbos. Cumq; æger debilis indiguerit solutiuo pharmaco, & nihil illud operetur, nequaquam debet is moueri: sed dimittendus est. Multoties præterea ventris solutio morbum excitat, febremq; parit, cui rei fortasse venæ sectio sat erit.

Caput Sextum quartæ fen: de immodica alui purgatione, & quando retinenda sit.

INter indicia quibus cognoscimus iam accedere tempus, quo alui purgatio sistenda sit, est sitis. Quod si purgatio perseueret, & sitis non euenerit, non est cur timeas eam modum excedere. At sitis nonnunquam accidit non propter multam & immoderatam purgationem, sed propter ipsum ventriculum, nam si calidus vel siccus fuerit, vel utrunq; horum habuerit, citissime sitiet. Itidem propter ipsum pharmacum id fiet, ut si fuerit calidum exustiuum. Itidem & ob ipsummet humorem si biliosus fuerit, ut flauibilis. Propter huiusmodi ergo causas non mirum si sitis acceleret. Quæadmodum si contrariæ his causæ contingant nihil à ratione alienum erit ipsam sitim tardius se offerre. At cum sitim immoderatam purgationemq;

non

non modicam videris, tum omnino reprime eam, præsertim si nulla causarum velocis ac citæ sitis adfuerit. In huiusmodi enim cum sitis appareat, haudquaquam differendum est. Et forte id quod expurgabitur, tēpus quo purgatio abscindenda sit tibi indicabit, nam vbi ex flauæ bilis purgatio iam purgationē deuenisse ad pituitam perspicuum fuerit, tūc excessum fecisse notabis. Maxime vero si ad atræ bilis purgationem res peruenerit. Sanguis autem solutus maximi periculi maximiq; momenti est. Ceterum si alicui tormina in ventre relictæ fuerint, recurrendū est ad id quod in tractatione de torminibus dictū est.

Caput septimum sen quartæ: Quonam pacto corrigendus sit affectus illius, cuius purgatio modum excessit.

Purgatio quidem redditur immodica, vel ob venarum imbecillitatem: aut quod earum ora referata sint: vel propterea quod purgatiuū pharmacum ora earum mordet: vel quia corpus ex eo malam acquisiuit temperaturā: & sic de alijs id genus. Si igitur alui purgatio immodica fuerit, tū sursum & deorsum extrema deliganda sunt, incipiēdo ab ascillis & inguinibus, & descendendo inferius ab eis: exhibendumq; d est

CAPVT

est parum medicamento quod ex viperis constat, theriacam vocant, & philonium. & sudorē prouoca, si fieri potest, siue balneo, siue vapore aquæ calidæ, sub eius pannis, è quibus caput extollat, & si sudor admodum exuperauerit, propina ei quæ stipant. Detergatur autem aut fricetur rebus astringentiam vim habentibus, adhibeanturq; ex aquis odoratæ maddactiones, vt sunt infusiones odoratæ, & sandali, & cāphora, & succus fructuum. partesque exteriores fricare atque calefacere oportet. Immo si opus sit cucurbitulæ ignitæ cum scalpellatiōe sub costis, ac inter humeros adhibedæ, & si necessum fuerit, emplastrum ex farina ordeï tosti, ac astringentes aquas ventriculo & visceribus superimponas. Itidem & olea astringentia, vt melinum & mastichinum. Aër quoque frigidus euitandus est, cōprimit enim, ac aluum soluit. A calido etiam aëre abstinendum: quia vires exoluit, & odoramentis fragrantibus hi confortandi sunt. stipticæque deglutiant. panem quoq; exiccatum, quem Arabes chahchah, nos biscoctum vocamus, vino aromatico deuorent, sitq; tale calidum, & quod iam antea sumpserit panem ex vino granatorum, & genera cibariorum ex farina ordeï torrefacti confectorum, & cortices papaueris contritas. Experientia quoque com-

comprobatum est, summopere valere semen nasturtij trium drachmarum pondere, quod prius torrefiat, mox lacte acetoso subagitur, dog ab Arabibus dicto, coquatur donec coaguletur, deinde potui detur. Cibus præterea debet vim astringendi habere, & niue refrigerari, velut est vinum, succus vuarum acerbarum, & id genus alia. Ad retinendas etiam alui fluxiões multum valet vomitum aqua calida excitare, extremâque in ea ponere. Quod si, gratia exēpli, animi deliquio corripiantur, propina eis vinū. & si id totū nihil proderit, tandē poteris vti his quæ vim obtinent soporificam, & quæ sunt valētissima remedia in tractatiōe de sistenda aluo cognita. Medicus adhuc debet apud se habere paratos tū pastillos ac pulueres stringentes deglutandos, tum etiā clysteres, ac eorum instrumēta.

Caput octauum quartæ sen: Si quis pharmacū solutium sumplerit & non soluerit.




Vm purgatiuum medicamētum nō purgauerit, tormināq; ac inquietudinem, capitīsq; dolorem, vertiginem, pādiculationes, oscitationēsve intulerit, recurrendū est ad clysterem ac glandes notas, bibātque è mastiche tres drachmas ex aqua tepida, & fortasse iuuabit pharmaci
d ij operatio-

CAPVT

operationem astringentiū potus, vefciq; postea citonijis, ac malis, vt quæ & os ventriculi & quod infra est comprimere valeant, naufeāq; sistant, & purgatiui pharmaci motum, qui sursum fertur, deorsum reuocent, naturamq; roborent. At si nihil clyster iuuerit, malaq; accidentia orta fuerint, vt corporis tētio, oculi præeminentia, motus quoque superiora petat, tunc haudquaquam poteris venæ sectionem euitare. Quod si nec pharmacum purgationem fecerit, maliq; casus subsecuti fuerint, incidere quoque venā postea par est, immo etiam post duos aut tres dies, nam nisi id fiat, timendū erit ne humores ad aliquas principes partes se conuertant.

Caput nonum fen quartæ : De medicamentis quibus purgandi vis inest.

 Vædam sunt solutiua medicamina, quæ admodum vitiosa sunt : vt hel-leborus, & genus tripolij quod turbit vocant: præsertim quod vitiosum est & genere croceum, itidem & agaricum, non album neque purum, sed ad nigredinem decliue, & sicut daphnoides, laureolam dicunt, hæc enim vitiosa sunt, & si quod horū sumatur, mala inde sequuntur accidentia, consentaneum igitur est à corpore quantum possibile

bile fuerit, vomitu aut aluo expelli, & medicamentum quod ex viperis constat (theriacem vocant) remedio exhiberi, & multotiens portio aquæ frigidæ, sedereq; in ea pharmaci malitiam pellit, vetatq; anhelitum ab eo corrumpi, quæ omnia ex turbit citrino & putrido inferri solent, ad idem valet quicquid acridinem sua glutinositate & lenificatione atque pinguedine infringit. Nonnunquam præterea adest quædam proportio inter medicamenta & quædam singularia temperamenta, ut scamonium, quod quidē in his qui in regionibus degunt frigidis, nisi in magna quantitate sumatur, exiguā efficit operationem, ut in regione Germanorum. Ceterum in aliquibus corporibus atque regionibus fortasse non oportebit substantiam medicamentorum exhibere, sed eorum virtutem. Porro medicamentis purgatiuis cōueniens est adhiberi medicamenta odora, ut per hæc membrorum vires seruentur, ad quod negocium medicamenta cordialia optime valent, cum vitalem spiritum in omni membro confortent, & maior pars horum sua tenuitate & penetratione ad id cōferunt, & quandoque coniunguntur duo medicamenta, quorum alterum cito, alterum vero tarde purgat suum humorem, primumq; cum suam cōpleuerit operationē, iam secundum

d iij dum

CAPVT

dum ad suum humorem vi quadam impulit, ac in ipsum egit, & eius vim hebetavit, adeo vt cum secundum postea suū agit opus, obtusi planē vigoris sit, mouens & non perficiens. Admiscendum igitur est illi aliquid quod eius vim incitet, festinareq; illud faciat: vt zinziber mixtum tripolio (turbit vocant) efficere solet, non finit enim illud longo torpere tempore, itidem efficit si ea exacte cōmisceas. Cōtemplari autem debes eas regulas quas de viribus medicaminum simplicium, vim purgatiuam habentium, exposuimus, vbi de vniuersalibus regulis simpliciu medicamentorū sermonem egimus. Medicamen adhuc purgatiuum quandoque sua proprietate digerendo, vt turbit, quandoq; comprimēdo soluit, vt mirobalanus, nonnunq; tamen lenitione, vt genus aërei mellis, quod Arabes siracost vocant, quandoque lubrica operatione soluit, vt succus pulicaris herbæ, quæ psylion vocatur & pruna. Maior autem pars pharmacorū fortium habet quid venenosæ facultatis, & purgat, donec vim inferat nature, idcirco corrigi debent ijs quæ pellēdi venena facultatem habent, quæ theriacalia remedia vocant. Nonnunq; vero amaritudo, acredo, astrictio, acrimoniaq; medicamenti, quā ponticitatem appellant, atq; eius acetositas actionem pharmaci adiuuāt:

ci adiuuāt: præsertim si cum eius proprietate conueniāt. nā amaritudo & acredo ad digestionē, acrimonia vero ad expressionē, & acetosa facultas ad incisionē, quæ ad lubricū reddendū præparat. Nec debent simul coniungi cum cōpressiuis quæ lubricent æquis portionibus, ita vt eorum vires inter se equales sint. immo aliud alio tardius operari debet, ita vt, gratia exēpli, illud medicamē agat suā operationem antē q̄ expressiūm, mox expressiūm superueniat & purget quod lenitiū leniuit. & seruata hac ratione in reliquis idem fiat.

Caput decimum sen quartæ: Quidnam hac de re alibi quærendum sit.




DN cōmentario nostro de medicamētorum cōpositiōe, quem Acrabadin inscripsimus, quæreda sunt medicamenta tum purgatiua tū etiam lenitiua, siue epota, siue inuncta, & id genus alia, ac illorū ætates. In tractatione vero de simplicium medicaminū materia, quærenda est correctio cuiuslibet simplicis medicamēti, & quo pacto eius defectui succurrendum sit, ac qualiter potui exhibendū sit. Catapotia quoque anteq̄ lapidis duritiem siccitate contrahant, deuorari debent. Neque ea dum recētia molliāque sunt ita vt hæcant & lentore suo
d iiij conglu-

CAPVT

cōglutinentur, deglutire licet: sed cum desiccari incipient, & digitis cedunt.

Caput vndecimum sen quartæ: De vomitu.

 Vi propter suam naturam minus ad vomitum duci debent, sunt quidem omnes qui angustum thoracem, vitiosamque respirationem habent, sanguineoque sreatui parati, & quicunque collum obtinent gracile, & quorum guttur abscessibus facile corripitur, ventriculūque imbecillum habent, atque admodū obesi: his enim alui purgatio debetur. Macilētis vero vomitus magis conuenit ob eorum biliosam naturam. Qui vero ob consuetudinem vomitum euitare debent, sunt quotquot vomitum moleste ferunt, vel insueti, nam si validis vomitiuis medicamentis ij euomuerint, ocysissime venæ membrorum respirationis scindentur, & in phtisim corruēt. At si res fuerit ambigua, fiat periculum leuibus vomitiuis, & si facile fert, poterit deinceps fortioribus vti: velut veratro & id genus alijs. Verum si aliquis, cui vomit⁹ planè prohibetur, ipsum euitare non possit, is præparandus, & ad consuetudinem ducendus est. alimenta lenia atque pingua & fluida ei exhibenda sunt, & à deambulationib⁹ quiescere debet, & postea vomitus

mitus fiat: pinguiaq; ac oleaginosa cum vino bibat:& ante vomitum optima edulia comedat, præsertim si cum difficultate euomat, nã fortasse nõ euomet, natura id recusante, quod quidem melius est bono quàm malo cibo adhibito. cumq; post cibum quem pro vomitu futuro assumpsit euomuerit, comedere differat, donec fames increuerit, sitimq; mitiget, velut cum syrupo de pomis sine aqua, & absque iulep & syrupo acetoso: hæc enim nausæa incitant. Cibus quoq; qui ei debetur, est pul- lus gallinaceus præparat⁹ cum iusculo, quod arabes adrabagi nomināt, & postea bibat tres cyathos. Quicumq; autem acida præter con- suetudinẽ euomuerit, in pulsu quoq; aliquid febris apparuerit, differre debet cibum vsque ad meridiem: antea tamen aquam rosaceam calidam bibat. Qui vero atrã bilẽ euomue- rit, sponsia aceto calido madefacta, ventricu- lo superponenda est. Cibus præterea eius qui vomitum facere decreuit, debet esse varius, quoniã si vnicus tantum fuerit cibus, fortasse ventriculus eũ amplectetur, & recusabit red- dere. post vomitum adhuc humectatium fa- tius erit comedere auiculas, & columborum pullos volantium: non tamen ossa extremorũ eorum, grauiã enim sunt, ac tarde ea vetricu- lus concoquit. Ad balneas quoq; se trãsferre debet.

CAPVT

debent Cumq; vomitium medicamentum biberint, currere ac decambulare, laborareve debent: mox euomant, idq; in meridie. Ante vero vomitum debet oculos linamentis adhibitis ligare, v̄tremq; valde leniter fascia obuoluere. Et quæ ad vomitū parant, sunt eruca, radícula quæ estur, & edulium ex pasta cōfectum, quod itria vocatur, & origanum montanum recens, & cepa, & porrum, & aqua ordei cum suo sedimento & melle, & edulium ex faba confracta confectum, vinumq; dulce, amigdalæ quoque ex melle, & id genus alia, & repletio ex pane azimo oleo preparato, & melones, & cucumeres, eorumq; semina, aut aliquid ex eorum radicibus aqua maceratis cōtusis, & suo modo dulcoratis: itidem & hermodactylus. Ille autem qui vinum vt euomat biberit, non debet post paucam eius quantitatem, sed post multam id facere. Zythus quoque, quod phoca Arabes vocāt, si ex melle post balnea bibatur, vomitum atque aluū mouebit. Ad hæc vomiturus non debet ante vomitum fortiter mandere quæ comedit. Ceterum qui validum medicamentum vomituum bibere cupit, vt veratrum, illud ieiunus bibat, nisi aliquid obftet, transactis duabus horis diei, reddito prius alui excremento. quod si penna vomuerit, bene est, si vero aliquātisper

per labores, & si id satis non sit, balneū ingre-
diatur, & penna qua vomitū irritat debet oleo
cyperi, Arabes alcānam dicunt, perungi, & si
exagitatio atq; molestia inferatur, bibat aquā
calidam, & oleum oliuarum, siue soluat, siue
non. Ad id quoq; conducit calefacere ventri-
culum, & extremas partes. nauseam enim in-
ducit. Cumq; vomituum medicamentū iu-
sto citi⁹ operari cœperit, qui euomit quiesce-
re debet, optimaq; odoramenta olfacere, extre-
maq; madefacere, & aliquid aceti bibere, & ma-
la atq; citronia cū paucō mastiche sumat. Nec
te lateat motum magis, quietem vero minus
vomitum inducere. Estas præterea ad vom-
itum tempus est maxime accommodatum, pro-
inde si quis corporis naturalē habitum, ad vo-
mitum minime propensum, habeat, eo tamen
indiget, æstate tutius ei conceditur. Remoti-
or quoq; termin⁹ à quo vomitus fit, quoad pri-
mam expurgationē, est ventriculus, etiā sine
intestinis. Sed quoad secundā purgationē, fit
à capite & reliquis partib⁹ corporis. Attractio
vero & exquisita eradicatio, ab inferis fit par-
tibus. Vtilem autem vomitum ab inutili di-
scernes, si eum alleuatio excipiat, & optima
appetentia, atque respiratio, pulsus optimus.
itidem & aliæ virtutes respondeant, & quod à
nausea initium sumpsit. Solet autē magis vo-
mitus

CAPVT

mitus offendere, quem ventriculi morsus vehemens comitatur, & exustio, si medicamentum fuerit validum, vt veratrū, quod cum sumitur, incipit primo effluere saliuā, deinde subsequetur eam vomitus, multæ pituitæ & excretiones, postea vomitus fluens vt sputū. morsus autem atque dolor manent, neque in alios casus permutantur, præter ipsam nauseam & eius molestiam, fortasse tamen venter soluetur, mox hora quarta incipiet quiescere, & ad requiem vergere. Vitiosum autem illud est, vbi vomitus non paret, molestiæque augeatur: tētio quoque ac oculorum prominentia, & eorum vehemens rubor, sudor exuperās, vox intercepta, nam si quis his afficiatur & non succurratur ei, ad interitū deueniet. Corrigitur autem id clystere & potu aquæ mulsæ, atque tepidæ aquæ, & oleorū antidoti vim obtinentium, vt est oleum de lilio, & conetur vt vomitus prouocetur: quoniā si euomuerit, nō suffocabitur, ad clysterem autem apud te præparatum conuerti debes. Porro vomitus maximè valet in diuturnis morbis, vt est aqua intercus, & morbus comitialis, & atra bilis, & lepra, & podagra, & coxēdix. At licet vomitus multa adferat iuuamēta, morbos tamen nōnunquā pārere solet, vt auditus grauitatem. Nec venæ sectio vomitui coniūgenda

genda est, sed in tertium diem differenda, præsertim si in ore ventriculi humor affuerit. Multotiens præterea vomitus redditur difficilis, ob humoris tenuitatem. quo fit vt crassior reddendus sit, sumendo farinam granorū mali punici tosti. Scire adhuc debes quòd si post vomitum excernatur per aluum corruptum excrementum, significatur nauseantium satietatem expulsam fuisse deorsum. Vomitus autem post alui deiectionem, significat ex alui accidentibus id fieri, & commodius tempus ad vomitū est æstas, propter eius raritatem. Valet præterea vomitus ad membrorum soporem: nocet tamen oculis. Prægnantē quoq; mulierem ad vomitū ne ducas, nā excrementa corporis ipsius non expelluntur per eum. vomitus autē ac labor eā in perturbationē ducunt: ideo sistatur. Quibuscūque vero alijs vomitus acciderit, opitulandū est.

Caput duodecimum sen quartæ: Quid à vomitu agendum.



VM vomitum quis peregerit, faciē, ac os aceto aqua temperato abluere debet, vt grauedo quę forte capiti illata est remoueatur, & de mastiche aliquid deuoret ex vino malorum, & cibū ac aquæ potum euitet, quiescereq; perseueret, & partes

CAPVT XIII.


partes præcordiorū inūgat, balneū quoq; ingre-
diaſ, ac cito ſe lauet, & egrediaſ ab eo. Quod
ſi à cibo abſtinere nō poſſit, comedat aliquid
delectabile, bonę ſubſtantię, facilis cōcoctionis.

Caput decimumtertium ſen quartæ: De vo-
mitus iuuamentis.

Vbet Hip. ſingulo quoq; menſe vo-
mitum fieri, duobus diebus cōtinuis,
vt ſecūdo die ſuppleatur id quod pri-
ma deficit, aut difficile fuit, & vt id,
quod ad ventriculum tractū fuit, egrediatur.
pollicetur enim Hip. hac ratione ſanitatē cō-
ſeruari. Sed malū eſt eum crebrius repetere.
Huiusmodi præterea vomitus pituitā ac fla-
uā bilē euacuat, ventriculūq; expurgat, nihil
enī aliud vētriculū natura purgat: vt ſit inte-
ſtinis, quę quidē à flaua bile ad ea effuſa pur-
gātur, remouetq; grauedinē capiti euenientē,
viſumq; acuit, nauſeatiuā fatietatē pellit, & il-
li in cuius ventriculū bilis, quę cibū corrup-
pit, effunditur, opitulatur, nā præcedente vo-
mitu, cibus repurgatum ſtomachum reperit,
prohibebitq; ventriculū ab abominatione rei
pinguis, verēq; appetentię deiectionē tollet, &
ne acuta & acida atq; acria deſideret, & cōfert
laſſitudini corporis, ac vlceribus renū & veſi-
cæ. Eſt quoq; præſentaneum remedium mor-
bo

bo elephanti, & vitioso colori, morboq; comitiali à ventriculo proueniēti, morbove regio, ac orthopneæ tremori, ac resolutioni, estq; remediū efficacissimū illis qui impetigine laborant. Debet autē semel aut bis in mense post repletionem ministrari, nō obseruato aliquo statuto circuitu, neque numero dierum certarum. Vomitus deniq; magis ei cōuenit qui natiuo tēperamento biliosus ac macilentus est.

Caput decimumquartum fen quartæ: De nocu-
mentis vomitus qui modum excedit.

I vomitus modum excedat, proculdubio nocebit vētriculo, eūque debilitabit, atq; dissoluet. & vt materiæ ad eum tendāt propensio-rem reddet. thoraci quoq; ac visui, dētibus, doloribus capitis diuturnis, nisi per ventriculi cōmunicationem id fiat, satis officiet. Sed & morbo comitiali, qui ex capite fit, nocet, & non propter inferna membra. Immodicus quoque vomitus epar, pulmonē, visumq; lædit, & forte aliquas scindet venas, sunt tamen nonnulli qui cito repleri cupiunt, & cum non possunt id ferre, ad vomitum se conuertunt, quod quidē negocium in pessimas egritudines diuturnas eos ducet. Debent igitur repletionem cauere, cibūque ac potum equare.

Caput

CAPVT XV.

Caput decimumquintū fen quartæ: Quoniam pacto prouidendum sit casibus qui vomēti accidere solent.



Væ vomitum prohibent, abundè à nobis dicta sunt, tentioni vero ac dolori sub præcordijs euenientibus satis confert calefacere ea fomentis aquæ calidæ madidis adhibitis, oleisq; leniētib⁹, cucurbitulisq; ignitis. Morsum vero validum qui in ventriculo relictus est, tollit potus iuris pinguis facilis concoctionis, locūq; oleo violaceo inungere admixto oleo ex violis luteis, seu albis, quæ cheiri ab Arabib⁹ nūcupatur, cōfecto ex pauca cera. Sed si singultus accidat, & perseueret, sternutatione ac calida aqua sensim hausta mitigatur. De sanguinis vero vomitu, iā in sermone nocumentorum vomitus egimus. Tētionī vero (quam tetanum vocant) ac morbis frigidis, ac sopori, vociq; interceptæ, quæ vomitum subsequi solet, succurritur extremorum deuinctiōe, atquæ forti frictione, ventriculique calefactione ex oleo oliuarum, in quo decocta sint ruta & cucumeres siluestres, qui elateriū dicitur, & potu aquæ mulsæ ex aqua calida, quo remedio vtatur ille qui sopore correptus est, in ei⁹sque aures immittatur.

Caput

Caput decimum sextum fen quartæ: quid agendum vbi vomitus modum exceſſerit.



S dormire debet, omni que industria ſomnus cōciliandus eſt, extremæque deuincienda ſunt, vt in aluo ſiſtenda facimus, vētriculo quoq; remedio eſt admouere emplaſtra, vim adſtringendi habētia, cōfortātia. At ſi vomitus immodicus fuerit, & adeo expulerit vt ſāguis euacuetur, tūc potu lactis ex vino mixti, quatuor cotylarū quantitate (ſeu ſextariorū) id prohibeatur, nā hoc leſionē medicamenti vomitorij hebetat, ſanguinēq; prohibet, ac aluū mollit. Quod ſi præterea partes thoracis & vētriculi à ſanguine expurgare cupieris ne coaguletur, ſyrupū acetofum niue inſrigidatum ſenſim ei propinabis. Et aliquando ad id valet potus ſucci portulacæ ex gleba armena. At ſi medicamē, quod excremēta ventriculi per vomitū euacuauit, modū exceſſiſſe metuis, alio loco petenda ſunt remedia. Vomitoria vero medicamenta, iuxta ſuos ordines, & quo pacto quodlibet eorum propinari debeat, & præſertim helleborus, ex commētarijs de compoſitione medicamentorum, ac de materia ſimplicium medicaminum petendum eſt.

Caput decimū ſeptimū fen quartæ: De clyſtere.
e Clyſter

CAPVT XVII.



Clyster quidem est præstantissimum remedium pro excrementis euocandis ab ipsis intestinis, ac ad mitigandos dolores renū, & vesicæ, eorumq; apostemata, & ad ægrotudines intestini coli, ac ad trahenda excrementa à membris principibus supremis. Verum acres clysteres epar debilitant, febrimq; pariunt. Valent præterea clysteres, ad discutiendas reliquias, quæ post euacuationes relinquuntur. Forma vero clysteris, & quo pacto fieri debeat, iam in tractatione de dolore colico nobis explicatū est. Melior autem situs, quo uti possit qui clysterem recipit, est, ut supinus iaceat, deinde supra partem doloris accubet. Tempus vero commodius est, quando aer frigidior existit, videlicet, antequam grauedo, molestia, perturbatio, ac animi deliquium inualescat. Balnei autem natura est, humores excitare, eosq; dissipare. Clysteris vero, eos trahere qui retenti sunt, idcirco, ut plurimum, non iuuat præponere balneum clysteri. Et si quis intestina habuerit vulnerata, indigeat tamen clystere, siue propter febrem, siue ob aliam ægrotudinem, & timeat ne clyster retineatur, is proculdubio debet sedem ac vmbilicum aliasq; partes circumstantes milio calido calefacere.

Caput decimooctauum, De linimentis.

Inter



Nter remedia quæ essentiam morbi attingunt, est linimentum, quandoq; autem medicamentum ipsum geminas obtinet vires, tenuem videlicet ac crassam: verum quæ tenuis est, magis desideratur quàm crassa. Quòd si crassities eius tenuitati equetur cum fiet emplastrum, pars quidem eius tenuis penetrabit, crassa vero retinebitur, acquiritur autem iuuamentum per id quod penetrat, veluti solet efficere coriandrum, cum fit ex eo & polenta emplastrum ad strumas, scrophulas dicunt. Emplastra tamen linimētis similia sunt: verum emplastra sunt crassa, tenacia, linimenta vero fluida. Multotiens quoq; linimenta admouentur ex frustis pāni. Cū igitur membris nobilibus, velut iocinori & cordi imponuntur, si huiusmodi pānus ex cruda aloë suffitus fuerit, summopere iuuabit, viribusq; linimentorum odoratā vim præstabit, prout res exposcet.

Caput decimum nonū sen quartæ: De embrochis seu irrigationibus.



Mbroche quidē præstantissima præsidia sunt, vbi desideratur vt à capite & alijs particulis aliquid dissoluatur, ac vbi necessarium est temperaturā aliquā permutare. Quod si aliqua mēbra postulāt irrigationē calidā & frigidā, si eò nō

CAPVT

confluant excrementa, primo quidē calidam irrigationem, mox aquam frigidā admouebis, vt robur illis inferat. Quod si contra res se habeat, tūc ab aqua frigida incipiendū est.

Caput vigesimū sen quartæ: de venæ sectione.



Enē sectio est euacuatio vniuersalis, quę plenitudinē euacuat, & ipsa plenitudo est humorū generatio in venis, maior q̄ sua mediocritas exposcat. Vena autē incidi debet duorū alteri: nēpe vel illi qui ægritudinibus obnoxius est, in quas corruet si eius sanguis multiplicetur: vel qui in eas iā incidit, horūq; vtriq; vel prę sanguinis exuperantia, vel prę eius malitia, aut propter vtrūq; vena secatur. Egritudines vero quas ille paratus est incurrere, sunt coxendix & podagra, si sanguineę eiuscemodi egritudines fuerint, dolorq; articularis qui à sanguine est, & sanguinis screatus cum accidit alicui, propterea quòd in ei⁹ pulmone aliqua venula rupta fuerit, parū admodū cōglutinata, quę quidē scindetur si sanguinis vel minimū augeatur. Ad hæc q̄ parati sūt incurrere morbū comitialē, & attonitū (quē apoplexiā nūcupāt) ac atrā bilē ex sanguinis redūdātia, & genera anginæ viscerūq; abscess⁹, atq; calidas lippitudines, quas ophthalmias dicūt. Is etiā cui sanguis hemorrhoidarū, qui consuevit effluere,

effluere, suppressus est, ac mulieres quib⁹ mē-
 ses restricti sunt venę sectione indigēt. Horū
 tamen duorū color nō indicat necessariā esse
 venę sectionē, ob eorū squalidū, obscurū, co-
 lorem, albūq; atq; citrinū. Porro qui mēbra
 intrinsecus imbecillia ex calida temperatura
 obtinēt, his pfecto satius est tēpore veris san-
 guinē detrahēre, etsi nōdū in huiusmodi mor-
 bos inciderint. Itē percussis, vel alto delapsis
 sanguis demēdus est ad p̄cautionē, ne in eis
 apostema oriatur. Adhuc aliquo apostemate
 laboranti, de quo, ne ante maturationē rūpat,
 vereatur, sanguis detrahēdus est, etsi venę se-
 ctione nō indigeat, neq; vlla adsit redūdātia.
 Scire quoq; debes, quōd si i huiuscemodi mor-
 bos nondū quis inciderit, timeat tamen ne eis
 corripatur, tutius ei cōcedi venę sectionem.
 Sed si in eos iā lapsus fuerit, tū in eorū prin-
 cipio penit⁹ abnegāda est, attenuat enim ex-
 crementa, per corpusq; ea permanare facit, &
 sāguini integro ea quoq; admiscet, immo ni-
 hil forte opportuni euacuabit, cogetq; venę
 sectionē nō sine noxa repetere. vbi vero cōco-
 ctio apparuerit, & principiū atq; vigor iā trā-
 fierit, tunc si venā secare est necessariū, & ni-
 hil prohibeat, secetur. At qui nec venę inci-
 sio nec euacuatio est faciēda in die mot⁹ mor-
 bi, est enim dies qua tū requies tū somnus in-
 duci

CAPVT

duci debet, in eaq; ipse affectus incitat. Cūq;
 egritudo habuerit iudicia, quę crises appellā-
 tur, ac lōgi fuerit spaciū, haudquāq; debet mul-
 ta quantitas sanguinis euacuari, immo si fieri
 potest quiescat: sin min⁹, parce fiat sanguinis
 detractio: & sanguis qui per venę sectionē de-
 tract⁹ est, suppleat corpori, si poteris, roburq;
 viriū custodias in iudiciorū pugnā. Et si quis
 iā diu nō est vsus venę sectione, & in hieme
 lassitudine corporis moleste, ei pfecto vena
 incidēda est, & sanguis ad virtutē roborandā
 restituendus. Ceterū venę sectio, trahendo ad
 contrariū, aluū valde astringit. Porro cum ex
 copiosa sanguinis missione vires imbecillio-
 res redduntur, multi humores vitiosi inde gi-
 gnunt. Animi aut deliquiū, quod syncope vo-
 catur, accidit quidē initio venę sectiōis: quia
 quod insuetū est obuiat: precedente tamē vo-
 mitu id prohibet. Itidem efficit vomit⁹ fact⁹
 dū accidit syncope. Nec te lateat venę sectio-
 nem perturbationē excitare, donec quiescat.
 Dolor adhuc colic⁹ raro cum sanguinis mis-
 sione cōplicari potest. Grauidis pręterea ac q-
 bus mēstrua reddunt, nō cōcedit venę sectio,
 nisi magna emergēte necessitate: veluti si ne-
 cessariū sit magnū sāguinis excreatū sistere, si
 vires cōsentiāt. Scire adhuc debes, nō requiri
 semper venę sectionē vbi adsint signa reple-
 tionis

tionis prædictæ. immo fortasse erit repletio ex crudis humorib⁹. & tunc sanguinis detractio valde nocebit. Quoniã si venã secueris, nō fiet cōcoctio, & verendū est ne æger pereat. Ille præterea in quo atra bilis superat, nihil offendet si vena ei scindat⁹, & postea purgatiōe euacuetur. Sed ipsum colorē inspicere debes, sub cōditiōe quam dicem⁹, tentiōemq; animaduvertere, nā si tentio per corpus expandat⁹, ipsa cōiectura docebit venę sectionē esse necessariam. Sed si sanguis ei⁹ optimus pauc⁹ fuerit, & in corpore multos humores vitiosos habuerit, tūc sanguinis missio bonū tollet, & vitiosum relinquet. Sed si quis paucū & malum obtinet sāguinē, & ad aliquod mēbrū se cōuerterit, ita vt illud valde offendat, nec à venę sectionē excusari possit, tū exigua quātitas sanguinis detrahīt, mox optimo alimento refici debet. Deinde tēporis spacio iterū alia vice sāguis mittat⁹, vt vitioso sublato optimus restituat⁹. Quod si ei⁹ vitiosi humores fuerint biliōsi, oī ingenio vti oportet, vt primo solutiōe alui, aut vomitu euacuent⁹, & quiescāt, omniq; studio requies atq; ociū egro inducant⁹. Sed si crassi fuerint humores, ātīqui iusserūt balneo vti, & aluū subducere. Nōnunq; præterea ante sāguinis missione & postea añ repetitionē exhibebūt syrupū acetosū, vim attenuādi obtinētem

CAPVT

nentē, cū decocto hisopi & fatureiē. At si co-
 garis venā incidere, virtute existēte debili ob
 febres aut vitiosos humores, tūc sāguinis de-
 tractionem in plures vices partiri, vt proba-
 uimus, satius erit. Porro angusta venæ sectio
 virtuti vtilior est, verū forte sanguis tenuis &
 clarus ex ea fluet, crassus interim ac turbulē-
 tus retinebitur. Latior vero citius animi de-
 liquiū infert, & ad purgationē magis facit, ad
 cōglutinationē vero tardior est: cōmodior au-
 tem est illi cui vt mundificetur vena secatur,
 atq; pinguibus, itidem tempore hiemis latior
 cōmodior est, ob sāguinis coagulationē: æsta-
 te vero angustior, si ea indiguerit. Cūq; vena
 inciditur, iaceat supinus, huiuscemodi enim
 situs est ad virtutem custodiendā aptior, nec
 animi defectū incurret. In febrib⁹ autē vehe-
 mentis inflāmationis, non est venę sectio ad-
 mittēda: nec initio cuiusuis febris nō acutæ,
 neq; in dieb⁹ circuitus, vbi præterea in febri-
 bus cōuulsio associatur, raro debet cōcedi ve-
 nę sectio, quāuis videatur esse necessaria: quia
 cōuulsio vigiliā atq; sudorē affert, viresq; de-
 ijciet, idcirco relinqui debet sanguis, qui sit
 pro tempore necessitatis paratus. Itidē in fe-
 brib⁹ nō putridis, si sanguis mittatur, sit exi-
 guus, vt p febrīū resolutione sanguis prom-
 ptus dimittatur. Quod si febris nō fuerit ma-
 gni.

gni estus, fuerit tamen putrida, tunc decem illas conditiones prædictas inspicere oportet, mox venam inspicias, quæ si crassa fuerit, ad ruborem declinans, & pulsus magnus, & figura tumida, & febris in motu suo non fuerit velox, tunc venam incide vacuo ventriculo. At si urina tenuis vel ignea fuerit, figuraque ab initio morbi extenuata, caue ne venam seces. Quod si febris illa interpellata fuerit, ac in veram quietem defierit, in illis sanguis mittatur. Rigorem quoque contemplari debes, nam si fuerit vehemens, caue ne venam aperias, inspicereque debes colorem sanguinis qui egreditur: quoniam si fuerit tenuis, ad albedinem attinens, illico eum retine. Et in vniuersum cauere debes, ne egroto duorum alterum afferas, vel humorum biliosiorum proritationem, vel frigidorum cruditatem. Cumque in febre cogimur venam secare, non animaduertas dicta illius, qui dicit eam post quartam diem non habere locum, immo urgente necessitate potest admitti etiam post quadragesimum, & hæc est sententia Galeni, quanuis apparentibus veris indicationibus, satius erit eam quam citissime anticipare. Quod si id quod conueniebat neglexeris, tunc quocunque tempore poteris uti venæ sectione, dummodo conueniat vtere ea, considera- tis tamē prius illis decem conditionibus iam dictis. Nonnunquam præterea fit venæ apertio & si non
in-

CAPVT

indigeas ea, in ipsis febribus, vt diminuta materia eā natura superare valeat, ipsa tamē habitudine, etate, viribusq; vnā cū reliquis, consentientibus. In febre vero ex sanguine pendēte, nō potest euitari sanguinis detractio, quę in principio nō exuberās, tempore tamen cōcoctionis copiosa fiat. Sæpiissime enim recedit ipsa febris post sanguinis detractiōē. In habentibus autem temperaturā immodice frigidā, & in regionibus valde frigidis, & dū dolor est validus, & post balneū vires dissoluens, atque post veneris vsum, in etate quoq; minore quatuordecim annorū, euitāda est venę sectio, quoad fieri poterit, in etate senij quoq; quantum fieri poterit, caue ne sanguinē ē vena mittas: nisi forte in corporis habitu, ac musculorū dēfuitate, venarū amplitudine, earū plenitudine, ac coloris rubore cōfidamus, his enī hortantibus tam senioribus q̄ pueris potest cōcedi. Iuniores vero parca sanguinis subductiōe paulatim ad id duci debēt. At quicūq; supramodū sunt obesi, vel macilēti, aut carnis raritatē obtinētes, & pituitosi tumidiores, & pueruli, qui sunt sanguinis expertes, his venā incidere, quantum possibile est, caue, & qui diu ægrotauerint, nō sine maximo discrimine sanguinē detrahare licet: nisi forte in his sanguinis corruptio id hortaret, tunc enim potest sanguis
mitti.

mitti, & illū inspiciere debes, qui si niger crassusq; fuerit, eū extrahe, sed si eū albū tenuem videris, claude statim: quoniā maximū periculū afferet. Post cibi repletionē quoq; cauēdū est venā incidere, ne humor incoct⁹ ad venas trahat, loca rei euacuatę. quod quidē obseruādū adhuc est vētriculo existēte repleto, ac intestinis excremento sicco cōcocto, vel ferē cōcocto abundātibus. Sed quod in ipso vētriculo, & sibi annexis existit, vomitu euacuare studeat: ab intestinis vero inferiorib⁹, vt fieri poterit, etiā si clystere id fiat. Porro qui fastidio laborat, caueat venā aperire: sed differat donec ei⁹ satietas cōcoquat. Caueas etiā ne venā incidas ei⁹ qui acumē sēsus oris vētriculi habet, vel ibecillitatē. & qui generatiōe bilis ī ipso vētriculo īfestari solet, is cauere debet, ne à venę sectiōe icurrat periculū: & presertim dū est ieiun⁹. Eū aut qui acumē sens⁹ oris vētriculi obtinet. cognosces, quia à rerū mordicantiū deuoratiōe molestat. Qui vero imbecillū ipsū habet. eo q̄ ipsam quoq; appetētiā habet ibecillē, dolorēsque vētriculi patit. At cui⁹ orificiū vētriculi bilē recipit, vel solet sepiissime in eo generari, ex assidua nausea, ac frequentissimo bilis vomitu, necnō ex eius oris amaritudine id dignoscere poteris, ij inquam si vena feriatur, non habita præcautione prius ad
oris

CAPVT

oris ventriculi confortationem, maximū in-
current discriminē, & forte aliqui eorum mortē
subibunt. Quocirca si quis acute sentit, vel
qui imbecillioris ventriculi est, debet sumere
frusta panis purissimi, musto cocto acetoso o-
dorato perfusa. At si ea imbecillitas à frigido
temperamento proueniat, tunc debes ea per-
fundere aqua muscata (quā such vocant Ara-
bes) cū aromatibus, aut syrupo de mēta odo-
rato, in quo muscus ingreditur, aut miua mu-
scata, deinde vena secetur. Ille vero in quo bi-
lis generat̃, debet vomitū aqua calida libera-
lissime epota puocare, ex syrupo acetoso. de-
inde aliquid degustare, parūq; quiescere, mox
venā secare. oportet autē vti omni diligētia,
vt id quod de optimo sanguine deperditū est,
restituatur, veluti carne super carbōes assa, si ro-
bustus fuerit: quāuis sit is cib⁹ satis grauis, nā
si cōcoquatur, in multū ac optimū conuerte-
tur alimentū, debet tamē esse id exiguæ quā-
titatis, quia venę sectio imbecillē reddit ven-
triculū, porrò quādoq; incidunt̃ venę, vt pro-
fluuiū sanguinis ē narib⁹, vel vtero, aut sede,
vel ex thorace prohibeatur, aut ex aliquibus
vulneribus, vt ipse sanguis ad oppositā retra-
hatur partē, hoc enim est præsētaneū reme-
diū, foramen autē debet esse valde angustum,
vicesq; debent pluries iterari, nō tamen eadē
die,

die, nisi vrgēte necessitate, sed alternis dieb⁹,
& qualibet vice minor fiat detractio, & vt sū-
matim dicam, pluribus vicibus sanguinē de-
trahere satius est, q̄ multiplicare quatitatem.
Ferire præterea venā, cum nō fuerit necessa-
rium, bilem incitat, ariditatemq; linguæ re-
linquit, & alia id genus, cui rei succurrēdum
est aqua ordeī ex saccharo, & si quis sanguinis
missionē repetere voluerit, & ex priori venæ
sectione nullum conuulsionis nocumentū se-
quutum fuerit, vel aliud simile, venā manus
per lōgum debet incidere, vt motu artus pro-
hibeatur cōglutinatio & dilatetur. Sed si ad-
huc dubitaueris ne celerrime coalescat, tunc
pannum oleo, & pusillo salis madefactum su-
perponas, qui superligetur, porrō si quū venā
aperueris, scalpellum perunxeris, velox quidē
cōglutinatio prohibebit, dolorq; mitior erit,
dūmodo leniter oleo vel alio simili superinū-
gatur, aut ipso oleo madefiat, deinde pāno de-
tergatur. Dormire insuper inter venæ sectio-
nem & iterationem, foramē coalescere celeri-
ter cogit. Nec obliuioni tradas quod dixim⁹,
solutiuam euacuationem in hieme diem au-
strinā desiderare, idem enim expostulat ipsa
venæ sectio, foramen præterea venę sectę, de-
lirantiū & stolidorum, ac eorum quib⁹ noctu
tempore somnij sanguis mittendus est, debet
esse

CAP V T

esse angustū, ne sanguinis profluuiū inducatur. Idem idē cui nō est necessaria iteratio, fieri debet. Nec te lateat iterationē esse tardandā iuxta magnitudinē imbecillitatis. Quod si nulla affuerit imbecillitas, ei⁹ terminus est vna hora. At si per huiusmodi sanguinis missionē intendim⁹ attractionē facere, tunc eius terminus erit vnus dies. Obliqua autē venę apertio, illi qui eadē die, ea vero quę per latitudinē, illi qui statim eā iterare proposuit, cōuenientior est. Sed quę per longū fit, magis cōuenit illi, qui nō est cōtentus vna tantū iteratione; & illi qui per multos dies quotidie vult de suo sanguine aliquid detrahere. & quanto venę apertio maiorē intulerit dolorē, tanto tardius cōglutinabitur. Porro cū per iterationē vberima fit euacuatio, affert animi deliquiū, nisi forte corpus ad plethorā declinet, aut ille cui iteratio fit, aliquid pręassumpserit. Inter venę apertionē pręterea & iterationem, dormire, excrementa cū sanguine expelli prohibet, cū humores per somnum ad imā partem corporis retrahātur. Inter cętera autem iuuantia iterationis, vnū est videlicet, quod vires illius, cui sanguis mittit̃, cōseruantur, ac euacuatio ei cōueniens pficitur. Melior vero iteratio est quę duobus aut trib⁹ differtur dieb⁹. Ad hęc illico à venę sectione dormire, lassitudinem

tudinē membrorū inducit. Balneū quoq; ante venę sectionē fortasse reddet eā difficilem; quoniā cutim crassiorē ac leniorē efficit, eāq; lubrico lapsui parat, nisi is crassissimum habuerit sanguinē. Ille præterea cui vena secatur, nō debet vnica vice tantū cibo repleri, sed sensim cibari, & in primis tenui victu vti. Neq; post eam quoq; deābulare debet, sed supinus iacere, nec post eam etiā debet vti balneo dissolvente. Et cū ex venę sectione manus intumuerit, alteri⁹ manus vena secari debet, & quantū vires ferunt sanguinē extrahere, & tumori vnguentū cerusæ adinoueatur, & partes circūiacentes remedijs vehementer frigidis liniātur. Si quis præterea abundantia humorū habuerit, & ei vena feriatur, ipsa quidem venę sectio erit causa irritationis illorum humorū, velocisq; motionis ac mixtionis eorum, indigebitq; frequentī venę apertioē. Ad hæc sanguis mēlancholic⁹ frequentem desiderat venę sectionem, quā statim alleuatio excipit: in senectute tamen aliquas postea inducit ægritudines, vt morbū attonitū, apoplexiam vocāt, porrò, venę sectio sæpissime excitat febres: sæpissime tamē putredinē dissoluit. Cui-cunq; præterea sano sanguis detrahit, assumēdū est id qđ in tractatiōe de vino predictū est. Nec te lateat, nihil aliud q̃ venas vel arterias
in cor-

CAP V T

i corpore aperiri: sed arterias rari⁹, idēq; nō sine
 discrimine, ob sanguinis profluuiū, & raro ge-
 nerat apostema: & id quidē quū scissura fue-
 rit valde angusta. Verū cū non timemus san-
 guinis profluuiū arterię, summopere iuuat in
 quibusdā ægritudinib⁹ particularib⁹ propter
 quas incidiť ipsa arteria. præcipuū autē iuua-
 mentū, quod ex arteriæ incisioe acquiritur, est
 vbi in aliquo mēbro ei vicino aliquę malignę
 ægritudines fuerint, quę à sanguine tenui ca-
 lido depēdēt: Si igit incidať arteria illi vicina
 nullo imminēti periculo, tūc summopere opi-
 tulari videt. In manu autē sex venę incidunt,
 videlicet capitalis, quam vocant cephalicā: &
 media, quā nigrā appellāt: & iecoraria, quę ba-
 silica nūcupatur: & funis brachij: & quę inter
 annularem & minimū digitū intercurrit, quā
 vocant Arabes sceilem: & axillaris, quę est ra-
 mus iecinorinę. Sed inter omnes cephalica est
 tutior. Et quęlibet illarū triū debet supra an-
 gulū cubiti brachij incidi, nō infra, neq; è re-
 gione ipsius, vt sanguis possit cōmode egredi
 quū destillat. Nocumētaq; neruorū atq; arte-
 riarū tuti⁹ euitant. Itidē de cephalica itelligi
 debet. Incisio tamē earū p lōgū tardius cōglu-
 tinať: quoniā sūt articulosę, in nō articulari-
 b⁹ verores opposito modo se habet. Sed vena
 coxēdicis, ac annularis, & reliquæ venę debēt
per

per lōgum incidi. Cephalica autē debet incidi infra caput musculi, in loco molliori, & foramen amplum fieri. Nec foramen foramini addatur, quoniā apostema parit. Et si quid erroris cōmittatur in venæ cephalicæ sectione, vt plurimū id non cōmittitur vnica tantum percussione, quātumcunq; fuerit magna. Sed lēgio ex iteratis percussionibus infertur. Eius vero sectio quæ tardius coalescit, est illa quæ fit per lōgum. Quod si sectionē te iterare cogitas, dilata foramē. & si nō inueniatur, queratur aliquis ramus partis exterioris brachij. At media vena, ob neruum sub ea existētem periculū minatur. Nōnunq; tamē inter duos nervos iacet: & tūc oportet vti omni diligentia, vt per lōgum incidatur, eiusq; sectio venā leniter perstringat. & fortasse super ipsā extabit aliquis nervus tenuis instar chordæ intentus: quæ quidē res dignosci debet, & cauere ne percussio eum offendat, quoniā diuturnā sēsus destructionē pariet. At qui nervos crassiores obtinet, is ramus in eo manifestior est. in quo si error cōmittatur, erit maioris nocumēti, quod si error cōmittat, & percussus fuerit ille nervus, non agglutines sectionē venę: sed admoue ei quod cōglutinationē cohibeat, & cura eā curatione vulnerum nervorum, de quibus iā in libro quarto fecimus sermonem.

CAPVT

Caue præterea ne quod infrigidet, vt est succus folani & fadalū, ei admoucas, sed ei⁹ partes totūq; corpus calido oleo perungas. Venā autē funis brachij fati⁹ est in obliquum secare, nisi vtrinq; subterfugiat: tunc enim in lōgū incidatur. Basilica vero maximo cū discrimine inciditur, propterea quòd arteria ac musculi neruiq; sub ea existunt, animaduerte igitur in eius incisiōe: quoniā si incidať arteria, vel nullo modo, vel cū maxima difficultate sanguis sistetur, sunt præterea aliqui habentes vtrinq; circum basilicā duas arterias, quarū si vna describatur, existimatur esse in tuto, cū tamen forte feriet altera. Id autē animaduertendum est, & cum ligatur apparebit ibi vt plurimū tumor, vel arterię quādoq; vel basilicæ, sed vtcunq; fuerit, debet solui deligatura, tumorq; blāditer perungi, deinde iterum ligari. Quod si iterum tumor redeat, tu quoq; iterum redi ad idē. & si id nō sufficiat, nō erit inutile si basilicā dimittas, & ramum, qui dicit axillaris, q; ad internā partē brachij ifra existit, icidas, multoties quoq; tumor augeť, & multoties ligatura sedat pulsū arterię, eāq; eleuat & attollit, & p vena reputatur, & inciditur, cūq; aliquā ligaueris venā, & ex huiusmodi ligatura appareant super ipsā veluti lēticulæ & cicera, tunc quod de basilica diximus

mus idē hic agere debes. Basilica insup quāto inferius ad brachiū eā incidas, tanto tuti⁹ est. Scalpellū autem debet per venā pcedere versus opositā partē arteriē, & error qui in basilica cōmittit̃, nō est ratione arteriē tātū: sed quia sub ea est muscul⁹ & neruus, & eorū causa error cōmittit̃, vt iā pauloante dixim⁹. Iudiciū vero quo dignoscere possis errorē fuisse cōmissum in basilica, & fuisse percussā arteriā, est, quia sanguis tenuis egredit̃, flauus, & quodā veluti saltu eiaculat̃, leniq; ac demisso quodam tactu, & tunc debes celeriter aliquid in foramē intromittere, velut pilos leporis ex aliqua portiōe thuris in puluerem redacti, & achilleā sideritē, quā superciliū Veneris, & sanguinē draconis vocāt, & aliquid aloes, & mirrhæ & chalcitidis, & mysi, & aspgere cū aqua frigida, quātū poteris: locū autē incisionis arctē liga: qua astricta nō soluat̃ p tres dies. post tertiu⁹ vero diē adhuc debes obseruare, quātū poteris, vt emplastra adstringētia ei parti adhibeant̃. Multi tamen sunt qui illā arteriā penitus fecāt, vt vena cōuellat̃, & carne coopariatur, adstringaturq;: sed cōplures ob sanguinis pfluuium perierūt. Aliqui etiā ob vehementē dolorē ligaturæ, cuius strictura valida querit̃ ad phibendū fluxū sanguinis arteriē, ita vt mēbrū ad perditionē deueniret, mortē

f ij subierunt.

CAPVT

subierunt. Nec te lateat, quòd nonnunq̃ sanguinis profluuium accidit quoq̃ in venis. Ad hęc scire debes, quòd vena humeralis ex collo & supra ipsum magis, infra vero, minus de sãguine euacuat, nec terminũ regiõis epatis ac partiũ præcordiorũ trãsit, neq̃ de inferiorib⁹ partib⁹ aliqd educit, qđ alicui⁹ sit momenti. Media præterea cõmune habet iudiciũ inter cephalicã & basilicã. & ipsa iecinorina euacuat à partibus thoracis, quæ ad inferiora vergunt. Et brachialis similať cephalicæ. Ea vero vena quã sceilen vocãt, dextra quidẽ, vt aiunt, dolorib⁹ epatis, sinistra vero lienis cõferre videtur. & debet apertio ei⁹ tãdiu dimitti, donec sanguis sua spõte sistat. Manus præterea eius cui vena secatur, debet calidẽ aquẽ admoueri, ne sãguis facile retineať, dũ segni⁹ fluit: vt plurib⁹ eorũ quibus vena sceilen secat̃ euenire solet, præstãtior autẽ sectio ipsius sceilen est, quæ in longum fit. Axillaris vero idẽ est cũ basilica iudiciũ. Atqui arteria, quẽ in manu incidiť, est illa quẽ sup̃ dorsũ palmẽ existit, quæ inter indicẽ & pollicẽ iacet: & est præsens remediũ epatis ac septi trãuersi dolorib⁹ antiquis, & Galenus refert se vidisse in somnio virũ dolore epatis laborãtẽ, cui præcepit hoc, & ita fecit, vnde sanatus fuit. Secat̃ adhuc nonnunq̃ alia arteria, quẽ magis hac ad
internam

internā partē palmæ declinat, quę quidem simile huic affert iuuamentū. Si quis præterea voluerit ē vena manus sanguinē emittere, & nō potest, nequaquā violentā inuolutionē, ac deligationē importune agat, neq; percussione scalpello iteret: sed sic p diē vel biduū dimittat. At si cogatur percussione iterare, eā quidem supra nō infra primā iteret. Violenta autē ligatura apostema affert. Infrigidare quoq; fasciā, eamq; ex aqua rosacea vel aqua frigida humectare, satis conuenit, & confert, ligatura quoq; nō dimoueat cutē à suo loco, nec ante, nec post venę sectionē. Valida præterea deligatio, in corporib⁹ macilētis est causa inanitionis venarū, ac sanguinis retentionis: sed in pinguioribus lenta nō permittit apparere venas, nisi valida fiat. Quidā quoque eorū qui venā incidunt, solent vti astutia, vt dolor nō percipiatur, soporem manui ex forti ligatura inducendo per horā. Nōnulli tamen scalpelli aciē oleo perungunt: & hoc, vt paulo ante diximus, dolorē mitigat, cōglutinationemq; remorā. Cūq; prædictæ venę in manu non apparuerint, sed rami earū: tūc manu premi debent fricādo. Quod si cessante frictione cōfestim eō fluxerit sanguis, quod & locus intumescat, tunc incidant: sin minus, nequaquā. At cū abluere voluerit, trahat parū cutim vt foramen

f iij ramē

CAPVT

ramen claudat: mox suo loco eā restituat, fascia autem optimè adhareat. Estq; cōmodior quę in orbē fit inuolutio, eaq; supinuolui debet. Cūq; in foraminis orificio pinguedo apparuerit, sensim intrō reuocari, nec abscindi debet, neq; ī his est adhibēda diligētia, vt fiat iteratio sine pcussione. Huius tamen negocij sententiā adhuc perficiā in calce hui⁹ capitis, nā inter loquendū de eo obiter ī sermonē incidim⁹. Nec te lateat sanguinis adstrictionē, incisionisq; ligationē, habere tēpus sibi statutū, & si id diuersum sit, nā aliquis & si febrēs fuerit, poterit ferre emissionē quādoq; quinq; aut sex librarū sanguinis: quidā vero & si sanus, adhuc vni⁹ librę extractionem sustinere nequit. Circa hoc tamē tria sunt cōsiderāda, Primo leuitas raritasq; sanguinis. Secūdo color eius: fortasse tamen faciet maximū incur rere errorē, si primo tenuis ac albus egrediaſ. At si signa plethorę ibi appareant, & res ipsa sectionē venę expostulet, nō decipiaris. Quādoq; etiā sanguinis color fallit in habentibus aliqua apostemata: quoniam apostema trahit ad se sanguinē. Tertio vero pulsus, quē haudquaquē negligere debes. Cūq; sanguinis impetuofus exit⁹ lāguere cōperit, aut colot sāguinis, vel pulsus ipse mutati fuerint, præsertim ad debilitatē, tūc eū retine, itidē si oscitatiōes ac pan-

ac pādiculationes nauseaq; acciderint. Q d si cito color aut impetus mutet, recurre ad pulsū, cui adhibēda est in hac re fides. Incurrunt præterea facillime animi deliquiū, qui calidi sunt tēperamēti, macilēti, & corpore raro: difficilior vero qui tēperaturā moderatam carnisq; densitatē obtinent. Dicit adhuc, quod q; secūde venę artem pfite, debet plura habere scalpella, quorum aliqua latiorē, aliqua vero angustiorē habeāt aciem. Quæ latioris sunt acuminis, venis qdē fugiētib⁹ ac declinātib⁹ maximē accōmodant: vt sūt venę iugulares. Is adhuc debet habere pillulā bōbacineā vel fericinā. Habeat quoq; instrumēta ad vomitū faciendū idonea, siue ex ligno, siue ex penna fuerint. Nec omittat habere apud se pilos leporis & medicamen aloes & thuris, folliculū musci, & electuarium ac trochiscos de musco, ideo vt si accidat animi defect⁹: qui quidē in sanguinis missione maximē timorē affert: immo forte mortē. festina igit tūc intromittere glomū in os ipsius ac vomitū puocato, instrumento illi negocio accōmodato, eūq; folliculū odoret, aliquid quoq; electuarij aut trochiscorū de musco deuoret vt vires excitentur. Quod si sanguinis pfluuiū ex arteria proueniat, festina replere foramen leporinis pilis medicamētoq; aloes. Et raro accidit syncope

f iiij dum

CAPVT

dū sanguis egreditur: sed vt plurimū postq̃ sanguis stiterit, accidere solet, nisi forte plus iusto effluxerit. In febribus autē cōtinuis, ac in initijs attoniti morbi, apoplexiam vocant, in anginīs, magnisq̃ abscessib⁹ interimētib⁹, ac validis dolorib⁹ virtute existēti forti, nō perterrearis si videas syncopē accidere. Sed quoniā inter loquendū de venis manus incidim⁹, in amplissimā orationē de alijs negotijs, adeo vt & venas pedis aliasq̃ omiserimus, ideo iustū iudico ad sermonē vnde digressi sum⁹ redire. Dico igit̃ inter venas pedis, aliā quidem esse coxēdicis, quę in extrema parte malleoli inciditur, siue supra, siue infra ipsū: deligandaq̃ est pars suprema, videlicet à crure vsque ad foramen, stricteq̃ deuoluenda, satius quoq̃ est eam antea abluere, in longumq̃ incidere. Quod si obscura fuerit, incidatur aliquis ramus eius, qui inter annularem & minimū digitū existit. Incidere autem coxendicem efficacissimū affert præsidiū, & præsertim podagræ, varicibus, morboq̃ elephanti: sed iterare eius incisionē difficile quidem est. Alia vero est ea vena quā saphenā vocant, quę in interna parte malleoli locata est, & magis q̃ coxēdicis est euadens. hæc autem ad euacuandum sanguinē à membris, quę infra epar existunt, eumq̃ à supernis partibus ad infernas euocandum

dum inciditur, & ideo mēses vehemēter citat, orificiaq; mariscarū aperit. Porro licet ratio ipsa dictitet sectionē venæ coxēdicis & saphenæ, iuuamentū non absimile præstare, experientia tamen cōprobatum est lōge efficaciorē esse vtilitatem incisionis venę coxēdicis in dolore coxēdicum, & id forte propter eius rectitudinē prouenit. Venę præterea saphenę sectio præstātior est, quæ fit in obliquū ad latitudinē vergens. Alia adhuc est vena, quę in angulo genu existit, nec eius præsidium est multū dissimile ab eo quod saphenæ. Verum ad menses ciēdos, & fedis, hemorroidarūq; dolores, præstātius q̄ saphenæ est remediū. Itē est alia vena in postrema parte calcanei sita, quæ est veluti ramus saphenę, & valet ad ea ad quę & ipsa saphena. Generatim aut venarū pedis incisio, ad ægri tudines, quæ fiunt ex materijs caput petentib⁹, ac ex atra bile ortis valet: sed vires magis q̄ ea, quę venarū man⁹ debilitat. Ad hęc venę, quę in partib⁹ capitis inciduntur, quas satius est in obliquū incidere, præter iugulares, guidez Arabes vocāt. Inter venosa præterea vasa, quędam sunt venę, quędam arteriæ. Venarū aut alia est vena frontis, quæ inter duo supercilia insidet: cui⁹ incisio cōfert dolori capitis, & præsertim in occipitio eius, grauediniq; oculorū, atq; antiquo capitis dolori as-

CAPVT

lori affiduo,cephalæam vocant. Alia vero est
 quę super caluariã sedet,quę hemicraniam &
 capitis vlcera secta iuuat. Aliæ adhuc duæ
 sunt,quæ apud vtraq; tempora extant reflexę
 venę,ac alię duę in angulis lachrymalib⁹,cā-
 thos vocāt, quæ vt plurimum nō se offerunt,
 nisi per gutturis suffocatiuā astrictionem, in
 quibus scalpellum non debet profundius agi:
 quoniã forte ex ossis persecutiōe affectus ille
 oriretur,quē aegylonē seu fistulā lachrymalē
 vocāt, ex eis tamē exigua quātitas sanguinis
 distillare solet. Earum autem sectio ad dolorē
 capitis ac hemicraniã, lippitudinēq; diutur-
 nam,quam opthalmiã vocant,ad lachryma-
 rum distillationē,ad suffusiōes, seu cæcitates,
 ac ad palpebrarū scabiem, earumq; ortum, &
 ad nyctilopā satis valet. Aliæ quoq; sunt tres
 venę exiguę,quę vbi definit extrema pars au-
 ris capillis cōiuncta,existunt, earum autē vl-
 tima trium euidentior est,quæ in initio suffu-
 sionis,& vbi caput recipit vapores,à vētricu-
 lo secatur:& propterea iuuat ad aurium vlce-
 ra,& occipitis,& partis postremę capitis. Ga-
 lenus autē negat id quod nōnulli affirmāt,vi-
 delicet,quòd viri cōtinentes secāt ambas ve-
 nas quæ sunt post aures,vt virile semen illinc
 abscindatur. Sūt & aliæ duæ venæ iugulares,
 quę in principio leprę & validæ anginae inci-
 duntur,

dunt, & in respirandi difficultate, dyspnœa vocatur, & in asthma calido, & in voce rauca, quæ inest patientib⁹ pulmonariâ egritudine, quâ peripneumoniâ appellât, & in mentagra, seu lichene, quæ ex excessiuo colore sanguinis puenit, ac i lienis affectib⁹ & præcordiorû. Et vt paulo ante dixim⁹, huiusmodi incisio debet fieri lâceola latioris aciei, ligatura autē debet fieri capite iclinato ad oppositâ partē sectiōis, vt vena tēdat. Inspiciēdaq; est ea pars, quæ est pcliuior, cui⁹ quidē pars opposita est incidēda, & obuolutio debet in latū, non in longum fieri, veluti fit in saphena & coxēdice: incisio tamē debet i lōgū cadere. Est & alia vena, quæ est in extrema parte nasi, quâ vocât leporinâ, & icidiť parte extrema nasi bifida, quæ digito pressa bisulca videt, ibiq; perforetur. Sanguis aut qui de ea fluit exigū⁹ est, cui⁹ sectio valet ad lentigines faciei, obscuritatēq; coloris, mariscas, exanthemata, seu tubercula nasi, ad eiusq; pruritū, verū aliquādo inducit diuturnā rubedinem faciei, quæ serpigini similatur, atq; adeo per faciē expandit, vt ei⁹ nocumentum mai⁹ sit iuuamēto. Venæ vero, quæ sunt post aures sub ossib⁹ eminentib⁹ è regione occipitij, Arabes casasa ea ossa vocant, si inciduntur, conferunt lippitudini, quæ ex tenui sâguine ortū habet, ac diuturnis capitis doloribus.

CAPVT

ribus. Aliæ insuper sunt venæ quatuor, quæ super labia iacent, binę scilicet super singulo labio: quarũ incisio vlceribus oris ac faucium, alcola Arabes vocât, nec non gingiuarum, earũ relaxatiõĩ, atq; abfcessib⁹ & hemorroidib⁹, earũq; scissuris confert. Sunt & alię venę sub lingua intra mētum, quę ad anginas, apostemata tonsillarũ, seu vt vocât duarũ amigdarũ, incidũtur. Reperiũtur adhuc alię venæ sub ipsamet lingua, quę ad grauedinẽ lingue, quę a sanguine est orta, incidũtur, & per longũ incidi debent. nã si per latũ incidatur, difficile erit sanguinẽ sistere. Est quoq; alia vena in ima parte labij, quę ad oris fœtorẽ inciditur. Item reperitur alia vena mandibularum, quæ ad oris ventriculi curationem inciditur. Arteriarũ autẽ capitis quædã est apud tempora, quæ aliquãdo more aliarũ aperitur: aliquãdo vero tota discindit: nōnunq; etiã distrahitur: quãdoq; vritur, idq; vt acres ac tenues destillationes sistatur fieri solet, vt quũ ocul⁹ dilatari incipit. Sũt & alię duę arterię post aures, quę ad varia lippitudinis genera, ac principũ suffusionis, hebetudinẽq; oculorũ, & nyctilopã, & ad dolorẽ capitis diuturnũ incidũtur, nō tamen sine discrimine: earũq; agglutinatiõ tardior est. Galenus autẽ narrat quendã fuisse vulneratũ in gutture, ita vt vulnus eius arte-

eius arteriā attigerit, vnde immodica quāti-
tas sanguinis effluxit: cui ipse Galen⁹ succur-
rit medicamine ex thure & aloes & achilleę, &
myrrhæ. itaq; sanguinem suppressit, dolorq;
diuturn⁹ quē in coxa habebat, ablatuſ est. Ex
venis præterea quæ in corpore aperiunt, duæ
sunt super ventrē, quarū altera super regionē
epatis iacet, altera vero sup lienē. ea aut quæ
in dextra, ad aquā intercutim, quę vero i fini-
stra parte existit, ad lienis affect⁹ incidiť. Nec
te lateat venę sectionē habere duo tēpora. al-
terū liberū, alterū vero coactū. ex arbitrio qui-
dē est, dū calor diei adest, pfecta iā cōcoctiōe.
violētū vero tēpus est, dū vrget necessitas ita,
vt differri nō possit, omnisq; causa, quę eā p-
hibeat, negligēda est. Scias adhuc quòd lāceo-
la nō acuta magnū infert nocumentū, quoniā
nō ptingēdo fallit, & apostema atq; dolorē pa-
rit. cūq; lanceolā intromittis, nō ipellas eā ma-
nu cōprimēdo: sed sensim pertrāseundo eā du-
cas, vt eius extrema pars, cauitatē venę attin-
gat. nā si plurib⁹ vicib⁹, id vi iterare conabe-
ris, ei⁹ extrema acies occulte disrūpetur: & sic
vena subterfugiet, & nō scindeť. Quòd si co-
neris venā incidere, malū addes. Idcirco an-
teq; venā ferias, & quādo percussionē iterare
cupis, debes experiri in tua cute, quo pacto lā-
ceola se habeat, omni præterea industria co-
nari debes

CAPVT

nari debes vt vena impleat, sanguineq; tume-
 scat. Sic enim lubricus lapsus ac recessus eius
 minus fiet. Quod si vena occulta fuerit, nec
 repletio sub digito appareat, tū iterū atq; ite-
 rū eā solue & liga, atq; perunge, & deligatio-
 nem modo sursum modo deorsum permuta,
 donec se offerat, idq; tibi succedet, si latitudi-
 ne extremitatū duorū digitorū locū vbi scis
 venā expādi palpaueris, ita vt quādoq; altero
 digito premas, altero vero sanguinem ē vena
 eminere facias, ita vt digito, qui permanet fir-
 mus, manifeste percipias, & dū eleuat vacue-
 tur, & dum remittit obseruet, & inter vltimā
 lāceolæ extremitatē & manum, aliquātula de-
 bet intercipi distantia, ne ad neruū vel arteriā
 eum penetrare faciat, tutiusq; est vt vena im-
 pleat vbi sit tenuior, lāceola īsuper debet pol-
 lice & medio digito apprehēdi, indexq; dimit-
 tat ad tentādum, ac in medio lamine apprehē-
 di debet, & nō supra: quoniā nō esset recta ap-
 prehensio. Cumq; vena ad aliā partem dimo-
 ta fuerit, occurras ei ligatura & apprehensiōe
 cōtrarię partis. Quod si vtrimq; dimoueatur
 indifferenter, caue ne eā per lōgū incidas. Sci-
 as adhuc quòd deligatio & depressio debet fie-
 ri iuxta duriciē, ac cutis crassiciem, & carnis
 multitudinē. debetq; ipsa deligatio proxima
 fieri. At si deligatio venā occultauerit, descri-
 be

be eā, & caue ne ipsa descriptio mobilitate ligaturæ recedat à sua rectitudine, & cum hoc adhuc suspende venæ incisionē, quod si vena cū difficultate repleatur & eleuetur, tunc p- fundè incide, præsertim in macilentis corporibus, & vtere vncino, cumq; ligatura & astringitio sit prope artum, non finit venā repleri, & cum locū lauare cupis, tunc digitis cutē super foramen trahe, vt è regiōe tegat, mox laua, & exicca, fasciolāq; imponas, & finito cutem ad locum suū reuerti, Nec te lateat eū qui præ nimia plethora sudat, venæ sectione indigere. nonnunq; præterea alicui febrienti, ac morbo comitali laborāti, cui pro vt eius affectus exposcit sāguinis missio cōueniret, superueniet naturalis alui solutio, & tunc ea nō indigebit.

Caput. XXI. fen quatæ: De cucurbitularum impositione, ac de earum scarificatione.



Vcurbitule magis, quàm venę sectio partes subcutaneas expurgāt, ac magis tenue q̄ crassū extrahunt, pingui- bus tamen corporib⁹, quæ crassiorem sanguinem obtinent, minus opitulatur: quon- iā nō educunt sanguinē eorū vt deceret, sed tenuiorē ei⁹ portionē, idēq; maxima difficulta- te extrahūt, particulā quoq; vbi infigunt im- becilliorē reddūt. Ex præcepto adhuc est ne cu- curbitulæ

CAPVT

curbitule admoucant in initio mēsis: quoniā
 humores nōdū sunt moti vel excitati: neq; in
 eius calce, cū sint diminuti, sed in medio eius
 dū humores excitātur, qui suo incremēto in-
 sequunt incrementum, quod in substātia lunæ
 augetur, crescitq; cerebri medulla in caluaria,
 aque quoq; fluminū fluentiū ac refluentiū au-
 gent, diei autē hora cōuenientior ad earū de-
 fixationē, est secunda & tertia, post balneū insu-
 per admoueri nō debēt, nisi forte quis crassū
 habuerit sāguinē. tūc enī debet balneo ablui,
 deinde aliquātulū morari, mox cucurbitulas
 īponere. Maior aut pars hoīm recusant appo-
 sitionē cucurbitularū in syncipite, quia pci-
 piūt & sensū & mentē ex eis offendi, sed si in
 caua parte occipitij adhibeantur, incisiois ve-
 nę medię supplēt vices. Grauitati quoq; sup-
 ciliarū auxilium prębēt, & palpebras alleuat,
 ac oculorū scabiei orisq; foetori opitulant. &
 si sup scapulas, cahal Arab. vocāt, īfigant, in-
 cisiois iecinorinę venę vicē gerūt, doloremq;
 humeri & gutturis leuāt, & si sup alterā duarū
 venarū colli posteriorū imponant, pcephali-
 ca valent, & tremorē capitis leuāt, membriscq;
 capitis cōferunt: velut sunt facies, dētes, mādi-
 bulę, aures, oculi, guttur, nares. Verū, vt īquit
 Muhamat, Si cavitati occipitij īponant, obli-
 uionē inducūt, cum posterior pars cerebri sit
 locus

locus memoriæ, quæ cucurbitulæ imbecillum reddunt, sed si sup̄ cahel apponant̄, os ventriculi debilitant, & si sup̄ venas colli posteriores, quas cadahin Arabes vocāt, infigant̄, fortasse inducent capitis tremorē. Idcirco à cavitate occipitij parū descendere, & supra scapulā parū ascendere licet, nisi forte sanguinis suffusioni, vel tussi succurrere velimus. tunc enī nō debet ascendi, sed in suo loco dimitti. Apponere autē cucurbitulas super cahal, & inter humeros, sūmopere valet ad ægritudines pectoris ex sanguine pendentes, & ad sanguineā cōuulsionē, sanguineūq; catarrū. Verum stomachū debilitat, ac tremorē cordis parit. Porro si cruri superponant̄, iuuamētum, simile adferunt quod ex saphenæ sectione haberi solet, sanguineūq; mundificāt, mēses ciēt. Mulieri insup̄ quæ & albū colorē, ac rarū habitū, tenuēq; sanguinē habet, magis expedit cucurbitularū appositio super crura, q̄ venæ saphenæ incisio. Præterea si super verticē ac mediā caluariā infigant̄, ad deliriū ac vertiginem, vt à nōnullis traditū est, & ad tardā caniciem valēt. Sed hæc sententia nō est omnino certa, nā in aliquibus corporib⁹, in aliquibus vero nō id effici potest: vt plurimum tamen solent caniciem accelerare, intellectūq; lædere. Oculorū tamen morbis auxiliant̄: &

g hoc est

CAPVT

hoc est remediū præstātius qđ ex huiuscemo-
 di infixione cucurbitularū haberi potest, nā
 cōfert & ipsa scabiei palpebrarum, tuberculis
 oculorū, egressioniq; corneę, vel vneę mēbra-
 nule: verū mentē offendit, attonitū morbum,
 obliuionē, malas cogitationes, morbosq; diu-
 turnos parit, officit quoq; his qui suffusionē
 oculi patiunt, nisi forte tēpus ad id faciendū
 cōmodū se offerat, nā sic fortasse nō nocebit.
 Ad hæc si sub mento imponant, dentib⁹, fa-
 ciei, gutturiq; p̄sunt: caput ac maxillas mun-
 dificāt, & si sup̄ coxendices apponant, ad ab-
 scessum femoris, eiúsq; scabiem & tubercula,
 podagra, hemorroidas, morbum elephāti, ad
 vesicæ ac vteri ventositatē, dorsiq; pruritum
 satis valent. Qđ si cū igne, & cū scarificatiōe
 apponātur, maiorem vim obtinent, vbi nō sit
 flatuositas: sed quę sine cōcissione imponūtur,
 vehementius flatū frigidū dissoluunt, eumq;
 in ea parte, vel vbicunq; existentē, discutiūt.
 Apponere quoq; eas sup̄ femore in intrinseca
 parte, satis p̄sunt ad testiū abscess⁹, ac femo-
 rū tibiārūq; tubercula. Sed quæ in posteriori
 femorū parte imponunt, ad abscess⁹ qui ī na-
 tibus orti sint valent. Et si sub flexura genu
 admoucant, cōferunt tremori genu ex acrib⁹
 humorib⁹ suborto, ac vitiosis abscessib⁹, & ti-
 biarū, pedūque putridis vlceribus. Sed quę
 super

super talos ponunt, ad menstruorū retentionē, & ad ægritudinē coxēdicis, & podagræ valent. Sed si sine scarificationē apponant, quandoq; retrahunt materiā à parte sui motus: vt cū māmīs infigunt, ad sanguinis menstruorū profluuiū sistendū. nōnunq; tamen apponuntur, vt apostema profundū extra euocetur, vt medicamen perueniat ad ipsū. Aliquādo vero vt apostema ad aliquod mēbrū ignobilius sua vicinitate trāserat. Nōnunq; adhuc admouent, vt membrum calefiat, & vt materia trahatur ad ipsum, eius quoq; flatus ventosi discutiant: & quādoq; vt ad suū naturalē locū mēbrum redeat, à quo dimotū est, vt fit in eo morbo quo intestina in scrotū dilabuntur. Apponunt quoq; vt dolor mitigeť, quēadmodū cū infigunt vmbilico ad difficilē dolorem intestini coli, ac flat⁹ ventris ventosos, vteri⁹ dolores, qui tpe mot⁹ menstruorū accidere solēt, & p̄sertim adoleſcētulis. Molliori quoq; parti cruris infigunt, ad coxēdicū dolorē: coxę vero ad luxationē. & inter ambas coxas si admoueātur, valent ad ipsa crura, & femora, & mariscas, ad herniā patientes, & podagram. Appositio p̄terea cucurbitularū sup podicem, trahit ab vniuerso corpore, & à capite, & cōfert intestinis, corruptionē quoq; mēstruorum sanat, & corp⁹ ab ea leuat, & vt aiūt, tria

g ij haben-

CAPVT

habetur ex ea iuuamenta. Primū euacuatio, quę ab ipsomet mēbro fit. Secūdū, quod substantia spiritus ita remanet integra, vt ad materię euacuationē nō sequat̃ eius euacuatio. Tertiū vero est, quod nobilia mēbra nō euacuat, debet tamē cutis cōcisio p̃funda esse, vt ex penitiorib⁹ partib⁹ attractio fiat. Aliquādo insup̃ intumescit locus vbi infixā est cucurbitula, ita vt difficilē auferat̃. tunc igitur pannū vel spongiā aqua tepida madidā, quę potius ad caliditatē declinet, accipere debes, qua circuit⁹ loci calefiat, hoc enī sepiissime euenire solet, vbi cucurbitulę supra partes māme infigunt̃, ad profluuiū menstruorū ac sanguinis nariū sistendū: & ideo nō debent super ipsamet māmam firmari. Cūq; locus vbi infigunt̃ vnctus fuerit, statim apponi debent, nec tardandū est: imo cōfestim scarificandę sunt, prima quoq; appositio sit leuis, facilis euulsionis, mox gradatim tardet euulsionē ac moram. Cui pręterea cucurbitulę impositę fuerint, cibus post horā dādus est, puero autem, qui iā tertiū egerit annum, cucurbitulę infigi possunt: sed qui sexagesimum egerit annū, nullo modo apponantur. Appositio pręterea cucurbitularum nos tutiores facit, ne materię ad partē inferiorem fluant. Sed si ille cui apponuntur fuerit biliosus, grana malorum punicorum,

VIGESIMVM SECVNDVM. 51

punicorū, eorūq; aquā, & intubū, & saccarū, lactucam, acetūque postea assumere debet.

Caput XXII. fen quartę: De hirudinibus.



Apientes Indi dixerunt aliquas esse hirudines natura venenosas, & ideo dānant magna habētes capita, & colorem antimonij, aut virides, & habentes in dorso veluti fila coloris cæsi, & eas quę alicui serpentū generi assimilant: quoniā his omnib⁹ inest vis venenosa, pariuntq; apostemata, vel animi defectū, aut sāguinis pfluuium, aut febrē vel lassitudinē, aut vlcera intractabilia: Ac reiiciunt quę ī aquis cœnosis, vitiosisq; captæ sunt: sed eligi debent quę in aquis, quib⁹ lenticulę supernascunt. Nec acceptes dictū illorū, qui affirmant esse vitiosas eas hirudines quę in aqua, ī qua ranę oriunt, genitę fuerint. Sed quod ad colorem earū attinget, præstātiores quidem sanguiifugę sunt, quę viridē in dorso obtinent colorem, & habent veluti duas lineas extensas in earū superficie, colore auri pigmenti: & quę sunt flauę, quę habēt corpora rotunda, & quę sunt coloris epatis, & quę similātur locustis paruis, & caudę muris nō absimiles, ac tenues, parua habentes capita: nec eligātur nisi quę ventrē rubē ac dorsū viride habent, præsertim si in aquis fluentib⁹ inueniātur. Hirudinū præterea

g iiij attractio

CAPVT XXII.

attractio maior fit ex intimiorib⁹ partibus q̄
 quę per cucurbitulas fiat, per diē quoq; adser-
 uandę sunt, postq̄ capte fuerint, anteq̄ admo-
 ueant, eas quoq; in contrariā partē earū sub-
 uertere debes, vt euomāt: & quicquid in vētre
 cōtinent si possibile fuerit, egrediaf, mox exi-
 guo sanguine agnelli, aut alterius id genus,
 respergēdæ atq; alendæ sunt anteq̄ adhibeā-
 tur, deinde capianf. & spōgia muccore & for-
 dib⁹ repurgādæ sunt, ea pręterea pars cui ad-
 mouēdæ sunt, debet prius nitro ablui, frictio-
 neq; rubescere, postea vero cum eas imponere
 volueris, demergātur in aqua dulci & expur-
 gētur, deinde defiganf, facit pręterea eas aui-
 dius adherere, si locus primò luto vel sangui-
 ne liniatur, Cumq; iam replete fuerint, & eas
 excidere desideras, tūc sale aut cinere vel ni-
 tro, aut linteolo vsto, aut cremata spōgia, vel
 lana aspergatur & excident, Satius autem est
 postq̄ exciderint, cucurbitulis aliquid sangui-
 nis illius partis exhaurire, quo nocumentum
 ex morfu earū impressum extrahatur, ceterū
 si sanguis emanare nō desinat, gallæ cōbustæ
 ei parti imponanf, aut calx, aut cinis, aut mir-
 tus tenuissime cōtrita, aut aliquid aliud id ge-
 nus quæ sanguinē supprimūt: quę omnia ha-
 beat parata, quādo eas admouet, Cōfert autē
 sanguisugarum appositio morbis subcuta-
 neis vt

neis vt serpigini, impetigini, & his similibus.

Caput vigesimūtertium sen quartę: Quibus nam remedijs euacuationes astringantur.



Acuatio quidem astringit, vel auer-
tendo materiā citra euacuationē, vel
euacuando cum auersione quoq; vel
adiuuando ipsāmet euacuationē, aut
medicaminibus refrigerantibus, cōstipantibus,
aut glutinantibus, vel vrētib⁹, vel deligatura.
Astringimus autē euacuationē per reuulsio-
nem sine euacuatione, vt si sanguis ab vtero
pfluxerit, & eū retinere volueris, cucurbitu-
las super māmā defiges. Melior tamen diuer-
sio est, qua dolor particulæ à qua reuelliť se-
datur, ea vero reuulsio quæ fit cū euacuatione,
est quæ per sectionē venæ iecinorinę fit, &
velut astrictio vomitus per alui solutionem,
& hæc per vomitum, & vtrunq; ipforum per-
sudorem. Astrictio adhuc fit auxiliādo eua-
cuationi, vt cū ventriculū & intestina ex hu-
morib⁹ glutinosis lubricū lapsum faciētibus,
hiera purgam⁹, vētriculiq; osculū vomitu ex-
purgare cogimur, vt materia quæ vomitū iā
firmatum efficit, abscindatur. Medicamenta
quoq; frigida id efficiūt: quia quod frigidum
est, congelant, osculaq; stupida faciunt, eaq;
angustiora reddunt. Medicamēta autē stipti-
ca, ideo id faciunt quia materiā cōprimunt,

g iiij mea-

CAPUT

meatusq; stipāt: sed glutinatiua medicamina, ppter ea quod in osculis obstructionē pariūt: quę si calida exiccantiāque fuerint, fortius id efficiunt. Medicamina vero crustā generātia, ideo id efficiunt, quia ea crusta sup ipsū meatum velut operculū manet, & claudit, eumq; strictē herere facit: verū adfert secum periculum, ne scilicet crusta decidat, & latior reddat meat⁹. Sunt pręterea aliqua incrustātia, quę adstrictiuā facultatē habent, vt Myfi: aliqua vero nō, vt calx nō extincta, vbi autē crustam diutius herere desideramus, adstringentibus crustificis tunc vtimur. Alijs vero, vbi citius crustā excidere cupimus. Fit adhuc retentio per ligaturā, partim claudendo meatum, & vt omni conatu, si opus sit, claudat: veluti ligamus cubitū, vbi medicus per errorē arteriam pro vena iecoris secuerit: partim replēdo ora vulneris, re viam claudente, qua vacuatio fit: vt si repleatur osculum vulneris pilis leporis. Dicim⁹ igitur quod si sanguinis profluuium ex reclusiōe orificiorū venarum fiat, vti medicamentis adstringentibus opus est, ac oscula earū cōprimere. At si ex eruptione id fiat, tunc adstringentibus simul & glutinantibus op⁹ est, veluti terra Lemnia. Quod si ex erosionē profluuium accidat, his quę carē em gignunt mixtis cū detergētibus mederi debet.

Caput

Caput vigesimumquartum fen quartæ: Quo
nam pacto obstructiones curari debeant.



Obstructiones quidē fiūt vel ab humo-
re crasso, vel ex lentis humoribus, aut
multis, quod si ex multis fiant humo-
rib⁹, nulla alia cōcurrente causa, tunc
ad auferēdā eorū læsionem satis erit vel san-
guinis missione, vel purgatiōe eos educere, at
si ex crassis, tūc medicamina dissoluētia, quæ
abstergūt, administrari oportet. Si vero gluti-
nosi fuerint humores, & præcipue tenues, tūc
incidētia medicamina necessaria sunt, nec te
lateat, quid intersit inter crassum & lentū, dif-
ferunt enim inter sese velut lutū & gluten li-
quidū. Crassum enī dissoluentib⁹ eget, vt at-
tenueſ & facile expellat⁹: glutinosū vero inci-
dentib⁹: vt inter ipsū, & id cui adhæret, sepa-
ratio fiat, vt ab eo expurgeſ & ei⁹ partes inci-
dant⁹, nā glutinosum suo lētore, ac suarū par-
tiū adherētia obstructionē parit. In dissoluē-
do præterea crasso, duo cōtraria sūt obseruan-
da, alterū scilicet ne fiat resolutio ita ībecillis,
vt raritatē materię, eiusq; molē augeat, citra
resolutionē, augēdo adhuc opilationem. Al-
terum, vero ne valida fiat resolutio, cuius te-
nuis portio in vapores: crassa vero in lapidem
vertatur. Cūq; valida indigebis dissolutione,
adiuua eam leui mollificatione, quæ fiat me-
dicamine

CAPVT

dicamine non crasso, habente calorem moderatum, vt valeat penitus dissoluere id quod facit oppilationem. Inter obstructiones præterea, difficilior quidem est quæ in venis fit: deterior autem hac quæ in arterijs: deterior adhuc est quæ in principibus partibus fit. Ad hæc medicaminibus recludētibus fatius quidem est admiscere aliquid vim astrictiuam & attenuatiuam habēs, quoniam illud astrictiuum grauitatem attenuantis corrigit.

Caput. XXV. fen quartæ: De cura abscessu.



Postematum quedā sunt calida, quedam frigida mollia, quedam frigida dura, quæ iam à nobis numerata sūt. Eorum autem causæ vel sunt extrinsecæ, vel præcedētes, intelligo autem per præcedentes, veluti plenitudinem: per exteriores vero, vt vuln⁹, casum, ictū, ac morsum. Porro quod ex causis exteris fit, vel cū corporis plethora, vel cum humorum moderātia accidit. Si cum corporis plethora antecedentes & exteriores causæ concurrant, profecto vel in vicinis partib⁹ ipsis principibus mēbris, ad quas fit transmissio, id fiet: vel non, quòd si nō, tunc in principio nihil resoluens eis admoueri debet: sed membrū impellens, si ad sit, corrigi debet, vel vniuersum corpus corrigat, si huiusmodi apostema non habuerit singulare mēbrum,

brum, admouendo ei quodcunque repellat, & ad oppositam partem retrahet & astringat. Et fortasse fiet tractio ad oppositam partem illius membri locati in parte opposita per dimotionem, aut si aliquod graue pondus ferat, nam sæpiissime trahitur materia à manu in qua est abscessus, si altera aliquod graue pondus feratur, per horamq; illud retineatur. Ea vero quæ vim astrictiuâ habet, in calidis quidem apostematibus debent esse exquisitè frigida: sed in frigidis mixta his, quæ vim obtinent & calidâ & astrictiuâ, vt est schœennâthos, & vnguis odorat⁹, seu cōchula idica, quâ blat-tam bisantiâ vocât. Accedente autem maturatiōe, minus astrictiua applicabis, quib⁹ dissoluentia admiscebis, donec peruenerit ad vigorem: tūc enim in equis portionib⁹ misceri debet. Sed dū inclinât, resoluētibus & molliētib⁹ vti sat erit, ea vero quæ frigida ac mollia dissoluūt apostemata, vim exiccatiuâ ac aridâ habere debet, q̃ quidē vis plus ī calidis reperiri solet. At apostemata quæ ab exteriori causâ ortū habent, nec vlla adest humorū repletio, debet oīno in principio mollientib⁹ & resoluētib⁹ curari: sed nō eo modo quo curasti primū genus. Verū si illud mēbrū qđ apostemate laborat, fuerit veluti excretoriū alicui⁹ prīcipis, vt sūt loca adnosa colli, & apud aures
 ipsius

CAPVT

ipsius quidē cerebri, ascellę vero cordis, īgui-
 naq; epatis, tūc nullo pacto debet eis applicari
 quod repellat, nō quali hęc nō sit vera curan-
 di ratio eorū apostematū : immo hoc est vere
 pręsens remediū illorū apostematū: sed nolu-
 m⁹ ea apostemata sanare, imo cupimus ea au-
 gere, materiāq; ad ea trahere, nec timem⁹ ad-
 dere læsionē illi particulę cū principi opitu-
 lari quęram⁹, nā si materiā reuelleremus, nū-
 q̄ sine formidine essem⁹, quin materia ad no-
 bile mēbrū pueniret, vnde irreparabile subse-
 quere^r incōmodū, nā nos pręeligimus mēbrū
 lędi ignobile, vbi nobili succurre^r, Immo nos
 studemus trahere materiā ad mēbrū ignobi-
 le, & vt in eo apostema oria^r, siue cucurbitu-
 lis, siue ēplastris calidis, vim attractiuā habē-
 tib⁹. Et cū hęc vel alia apostemata suppurā-
 tur, & pręsertim quę sunt in locis cauis, for-
 tasse spōte, vel auxilio maturatiuorum reme-
 diorū disrūpen^t, & fortasse maturare ac rūpe-
 re simul conabimur. Maturatio aut p̄fici^t his
 quę oppilatiuā ac glutinatiuā habēt vim ad-
 ditā calefactorię, quib⁹ ipse calor retinea^r. At
 si quis huiusmodi maturatiuis remedijs vti
 voluerit, debet animaduertere, vtrū calor in-
 natus sit ībecillus, & mēbrū tendat ad corru-
 ptionē, tunc enī ea quę vim habēt oppilati-
 uā & glutinatiuā admouere debet, & vti ape-
 ritiuis


ritiuis ac profunda scarificatiōe, mox resoluti-
 uis & exiccatiuis, vt adhuc in particularib⁹ li-
 bris sermo nobis cōplebitur. Sepe præterea a-
 postema est profundū, ita vt cogamur trahere
 ipsum ad partē cutis etiā cucurbitulis ignitis.
 At in duris apostematibus, quæ terminū vi-
 goris trāsierint, cōueniens remediū ac regula
 est, vti mollificātibus remedijs, quandoq; his
 quæ parū calefaciāt & exiccēt, ne præ nimia
 dissolutiōe quod crassius est duriciem lapidis
 assequatur. Immo id totū dissolutiōi paretur,
 mox dissolutio augeatur. Quod si postea ve-
 rearis ne ex dissolutiōe quod residuū est, in la-
 pidē vertatur, reuertere iterū ad mollificātia,
 & sic iugiter pcedas donec partim mollificā-
 do, partim dissoluēdo vniuersū apostema cō-
 sumetur. Apostemata vero tumida, quæ œde-
 mata vocātur, curantur medicaminibus ha-
 bētibus vim calefactoriā cū tenui substātia,
 vt flatus dissoluātur, meatusq; exigui dilatē-
 tur, nā horum apostematum tumidorū causa
 est crassus flatus ac meatuū obstructio, Opor-
 tet adhuc studere, vt amoueatur ea materia,
 quæ vaporē gignit flatuosum. Sunt præterea
 nōnulla apostemata vlcerosa, vt formica de-
 ambulatiua, quæ quidē remedia refrigerātia
 exposcunt, eiusdem generis sunt apostemata
 inflammata, quæ phlegmonē vocantur, at nō
 debent

CAPV T

debēt humectari, & si ipsi apostemati debereēt
 humectatio: immo exiccent, quoniā in his ac-
 cidens vicit iam causam. Est autem accidens,
 ipsum vlcus, quod affuturū timeēt, vel quod iā
 accidit. Vlceri enim cura exiccatiua debetur,
 cui nihil noxium magis ipsa humectatiōe. In
 intrinsecis vero apostematibus, debet materia
 minui per venæ sectionem & purgatiuū me-
 dicamen. Debent etiā qui apostematibus hi-
 sce vexātur, balneū vinumq̃, & motus corpo-
 reos ac animales immodicos, vt est iracūdia,
 & id gen⁹ alia, euitare. Deinde inter initia de-
 bent vti his, quæ sine molestia repellere vale-
 ant, præsertim si id membrū fuerit quale est
 ventriculus, & iecur. tēpore aut quo dissoluē-
 tia remedia cōueniunt, nō debent deesse tibi
 stiptica odora, vt in præcedentib⁹ sermonib⁹
 iā te admonuimus. & iecur atq̃ ventriculus
 inter cetera membra his stipticis magis q̃ pul-
 mo indigent. Ea vero remedia, quib⁹ vtimur
 vt aluum leniāt, debent esse medicamina, quę
 vim maturādī & cum ipsis apostematibus cō-
 uenientiā obtinent, vt hortense solanū, & cas-
 sia fistula. Valet autem ipsum solanū, ex pro-
 pria natura, ad dissoluenda calida apostemata
 intrinseca. & qui his laborant abscessibus, nō
 debent vti nisi tenui victu, & dum accessio nō
 adsit. si accessionem habuerint, neq̃ inter ini-
 tia,

tia, nisi forte urgente vehemēti imbecillitate. Et qui apostema viscerum simul cū defectu virium patiat, is ad interitū accedit, cum vires cibo tātum excitent, nihil autem magis le-
dit q̄ cibus. Q d si apostemata dissoluatur, bene est. Sed si disrūpanť, tūc quæ detergāt bibi debēt, vt aqua mulsa, & aqua ex saccharo, mox quę sensim maturent, cū his quæ vim exiccā-
di habent assumi debent. Tādem quæ exiccēt satis erūt. Sed hęc exacte cognosces ex libro, qui partiales cōtinet morbos. In apostematibus præterea internis, quæ sub vētre existunt, cōmittit error, cū forte nō sint apostemata sed rupturæ, & tunc eorum apertio erit timorosa, vel forte erit apostema internum quod nō est in peritoneo, sed in ipsomet intestino: & tunc apertio eorum non sine discrimine erit.

Caput vigesimum sextum sen quartę: De Apostematum apertione.

 I quis aliquem abscessum aperire voluerit, debet scissura rugas illius membri imitari, nisi id membrum fuerit frons, vel aliud simile. Nam si in eo scissura secundum rugas fieret, incideret musculos frontis, & supercilium caderet. Verum in membris in quibus rugæ contra ordinem villorum muscoli procedunt, cōtrarium fiat. Debet igit qui incidit, scire artem faciendi nervos,

CAP V T

uos, ac venas & arterias, ne oberret, & aliquid horū incidat, & medicamēta sanguinem adstringētia apud se parata habere, ac emplastra dolorē mitigantia, & instrumēta ad id idonea, habeatq; secū aliqua, vt sunt medicamina Galeni, & velut pilos leporis, & telas seu stamina aranei, & albū oui, & vrētia, omnia enim hęc phibent sāguinis fluxū, si accidat, siue ex errore, siue vi ad id inductus quis fuerit, & habeat penes se medicamina molliētia. Et cum aperitur abscessus, & extrahit id quod intus erat, non debet admoueri ei oleum, neq; aqua, neq; linimentū in quo sit oleum, vel seuum abundans, vt est vnguentū basilicon: sed debet apponi velut linimētum ex chalcitide, quod fiat cū eo indigebit: & supra ipsum imponat spongiam madefactam ex vino austero.

Caput vigesimumseptimum sen quartæ: De membri corrupti curatione, eiusq; sectione.



Ubi aliquod membrū corrūpitur ob aliquā malā tēperaturā in eo existēte, cū materia vel sine materia, & nō suffecerit scarificare, aut linire his quę ipsū corrigāt, de quib⁹ facta est mentio in libris particularib⁹, tūc caro corrupta quæ in eo est oīno auferatur, & sati⁹ est id sine ferro fieri, quatenus dā, quoniā ferrū si fortasse tetigerit muscutorū fibras & arterias, ledet eas. Sed si

Sed si id nō sufficiat, & corruptio iā deuenierit ad carnē, tunc necesse est ipsam secare, & locū sectionis oleo feruēte vrere. Sic enī à vehementia malitię ei⁹ nos tutiores reddit, fluxusq; abscindet, ac super locū scissum caro & cutis aduēticia dissimilis, simillima tamē, sua duricie ipsi carni oriet. Et cū deuenieris ad incisionē, debes intromittere stylū, quo fit tentamentū, & in circuitu ossis ipsum circūducere dū inuenias sanā vnionē. nā vbi dolor augeť ex styli ductu, inibi quidē sanitas terminat: sed si locus ille relax⁹ fuerit, & eius vnio imbecillis, tūc illud secari debet. Quandoq; pręterea perforabis id qđ circundat os, quod secare cupis, ita vt terebellis circundeť, & rūpatur, seceturve. Quādoq; vero ferra ferrabis. At cū id efficere volueris, fac vt intermediat aliquid inter instrumentū quo incidiť, terebellūmve, & ipsam carnē, ne dolorē adferāt. Et si super os quod secare intēdis fuerint veluti arteriæ pminētes, nō hærētes inter se, nec speret eas in rectā habitudinē reduci posse, immo timeas, ne id quod in eius circuitu est, corrūpatur, tūc caro debet ab eo remoueri, vel scissioē, vel deligatura, aut extēsiōe, ducēdo ad oppositam partē, vel aliqua alia industria, ad quā ipse visus te diriget, & si ibi aliquod mēbrum nobile adfuerit, tūc inter ipsū & illud os aliquid in-

h tercipli

CAPVT

tercipi curabis, velut septicis, ex frustis pannorum, vt his ab eo distet, deinde secca. At si huiusmodi os fuerit, velut os coxę, & magnū, musculis, arterijs, venisq; proximū, eius quoque corruptio immodica, tunc medicus debet ab eo negotio se abstinere.

Caput vigesimū octauum seu quartæ: De curatione solutionis vnionis, ac vlcenum generum.



Continuitatis solutio magnorū qdē mēbrorū, equatiōe, & cōueniēti deligatiōe, quę i arte ligandarū fractionū dicta sunt, & adhuc suo loco tibi diceſ, curaſ. Mox quiete, victuq; glutinatio, ex quo callū seu porū carnoſū gigni ſperabis. & vtrāq; partē fracturę maxia hēſiōe vnire facias, & ſupponas bractęas, quas ſup vnionē partiū valis ærei fabri ærarij ſolent apponere. labiaq; fracturę vi astringas, atq; iſpleas. nā falſū eſt poſſe coaleſcere os, præſertim in ætate adulta, niſi hac ratiōe: qm̄ nō pōt vllō pacto cōglutinari. De curatiōe tñ fracturę, adhuc faciem⁹ cōplectū ſermonē in ſingularib⁹ tractatiōib⁹. Curatione vero ſolutiōis cōtinui, q̄ in mollib⁹ cōtingit mēbris, tres cōplectiſ itētiōes, ſi cauſa fuerit fortis. Prima eſt, abſcindere id qđ pfluuit, ſiſtereq; materiā ei⁹ ſi feſtinet vt noceat. Secūda eſt, ſciſſionē vnire medicaminib⁹, ac cibis cōgruis. Tertia vero eſt, putredinē phibere quo

re quoad fieri pōt. Q d si his trib⁹ vnū defit, īspice reliqua duo. Quot aut modis sistat id qđ pfluit, iā nosti. Vnio vero fit cogēdo ī vnū labra vlcēris, si in vnū duci possint, exiccāti-
busq; ac glutinantiū assūptiōe. Nec te lateat intētiōe curatiuā vlcērū esse ipsā exiccatio-
nē. Q d si vlcus fuerit purū, exicceſ tñ: sed si putridū, adhibeant medicamēta acria corro-
dentia, vt ex chalcitide, & myſi, & arsenico, & calce: & si nō valeāt, tunc necesse est deuenire ad ignē. Medicamētū aut qđ ex flore æris, & cera, & oleo cōficiſ, moderatū est ī hoc nego-
cio, flore enī æris mūdificat: oleo vero & cera mordicatio imodica tolliſ. Dico adhuc, quōd omne vlc⁹ necessario est, vel solū & ipsū p se, aut cōpositū. Solū autē si exiguum fuerit, ni-
hilq; ī ei⁹ medio erosū fuerit, tūc labra debēt vniri, ipsūq; fascia inuolui, cū maxia tñ ani-
maduerſiōe, ne aliqd olei inter ipsa labra in-
tercipiat, aut pulueris inspergat: hæc enī p-
hibēt ipa vniri. Idētidē fieri cōuenit ī magno vlcere, cui⁹ substātiæ nihil defit, & pars altera alteri cōiūgi possit. At vlc⁹ magnū, qđ nō pōt vniri, siue id fuerit scissura, aut capacitas ple-
na sanie ex q̄ aliqd substātiæ ipsi⁹ mēbri de-
perditū fuerit, ei⁹ quidē curatio est exiccatio. Sed si id deperditū cutis fuerit sola, tūc quod cutē obducat exposcit, & id quidē vel per se,
h ij & tunc

CAPVT

& tūc astringētibus, aut per accidēs, & tūc calidis vti oportet, parū tamē, sūtq; id vltimū ex mysi, & chalcitide. Hæc enī magis faciūt ad exiccationē, & magis crustā gignunt, quod si imodica hæc essent, corroderet, vlcusq; augerēt. At si quod deperditū est, fuerit caro sola, vt in vlcerib⁹ pfundis, nō festines cicatricem obducere. Immo pri⁹ debes ī generāda carne studere. Gignunt aut carnē, quæ primū ordinē exiccādi nō multū trāsgrediunt. sed circa hoc quēdā cōtēplari prius oportet, primū tēperamentū radicale ipsius particulæ, tēperamentūq; vlceris. Nā si illud mēbrū fuerit temperaturæ valde humidę, vlc⁹ vero nō, tūc exigua exiccatio in primo videlicet ordine fat erit, quoniā morbus ipse nō multū distat à natura mēbri. Sed si mēbrū fuerit siccū, & vlcus vehemēter humidū, tūc quæ in secūdo & tertio ordine exiccāt, sunt necessaria, vt suę temperature restituañt. In tēperatis vero tēperata sunt opportuna. Ad hæc & vniuersi corporis tēperamentū īspicere oportet. Quoniā si corpus immodice siccū fuerit, & illud mēbrū qđ est auctū in humiditate, fuerit tēperate humiditatis in cōparatiōe ad corpus tēperatū, tunc debet equaliter exiccari, itidē si corpus fuerit in humido auctū, & mēbrū declinet ad siccitatē. Sed si simul ī excessū egrediātur, vel egres-
sio fiet

fio fiet ad humiditatē, tūc maior exiccatio cō-
 uenit: & si ad ficcitatē, minor exiccatio est ne-
 cessaria. Porro ipsi⁹ medicaminis exiccatiui
 facultatē contēplari oportet, nā licet exiccan-
 tia medicamēta, quę generāt carnem, nō adhi-
 beant, vt exiccationē ita validā efficiāt, qua p-
 hibeatur materia effusa, quę est apta carnē in
 mēbro generare, vt ea quę ad generandā carnē
 nō sunt adinuāta, sed ad obducēdā cutē, desi-
 derātur tamē vt magis detergāt & abluant, q̄
 quę exiccāt, & quę quidē vt sigillēt & cōglu-
 tinēt, admouētūr, & oīa medicamina quę ci-
 trā mordicationē exiccāt, inter carnē pducen-
 tia ascribūtur, quoniā omne vlcus in loco nō
 carnosō, nō est aptū cito sanari. Itidē neq; or-
 biculare. In medicaminibus prēterea exiccan-
 tibus & astringētibus, quę ad curationē vlce-
 rū internorū administrātur, debēt admisceri
 quę detergāt, vt mel, ac ea quę ppriā respiciūt
 particulā, velut quę vrinā ciēt, vbi instrumen-
 torū vrinę accōmodatorū vlcera curare tēta-
 mus, sed cū cicatricē ducere cupimus, tūc me-
 dicaminib⁹ vtimur, quę cū sua astrictiōe ha-
 beāt adhuc exiccare & cōglutinare: vt est ter-
 ra Lemnia, quā sigillatā vocāt. Scias adhuc q̄
 multa sunt quę vlc⁹ sanari phibēt, vt est mē-
 bri intēperies: idcirco oportet eius correctiōi
 studere. Mala quoq; sanguinis tēperatura qui

CAPVT

ad ipsū vadit, idē phibet. Quare his qui optimū humorē gignūt corrigi debet. Multitudo adhuc sāguinis qui ad illud fluit, ipsumq; humectat, id quoq; efficit: cui succurrēdū est euacuatione, & vict⁹ attenuatiōe, deābulationeq; si fieri pōt. Ad hęc ossis ei subiacentis corruptio idē facit, emittēdo sanie, qđ quidē vitiū nullū habet remediū, nisi rectificatione illius ossis, eiusq; abrasione, si fieri pōt, vt abrasio corruptionē tollat, ablatiōeq; atq; sectiōe. Sepissime præterea cogit qui vlcera sanat, vt ferat apud se emplastra trahētia ossis fragmēta, habeatq; instrumēta quib⁹ ea educat. aliās enim vlc⁹ sanari impedirēt. porrò vlcera cibo indigēt, vt opituleſ eis: sed ei⁹ minutiōe, ad abscīdendā materiā saniei. Verū hęc duę necessitates inter se differūt: qm̄ sanies vires debilitat, ppter ea roboratiōe idigēt, at vbi multiplicatur, iedia indiget, quo circa medic⁹ debet esse hui⁹ negocij rector. Cūq; vlc⁹ fuerit in principio, & incremēto, nō debet balneū īgredi, nec aquā calidā tāgere: qm̄ traheret ad ipsū qđ apostema augeret. at si iā vlc⁹ qeuerit, & sanies genita fuerit, tū forte id licebit. Omne pterea vlcus qđ citi⁹ iusto claudis, dū in sup̄ma parte cōsolidat, est in via ad cācrenā. Inspecere igit oportet semp saniei labrorūq; vlc̄eris colorē. qđ si sanies multipliceſ, nō multiplicato cibo, illud

illud est ipsa maturatio. Nunc vero de curatioe
 rupturę differam⁹, & dicam⁹ q̄ cū ruptura sit
 solutio cōtinuitatis p̄funda sub cute, idcirco
 valētiora medicamēta requirit, q̄ quę i sūmo
 corpore existit, sed qm̄ sanguis vberrime cō-
 fluit ad eā, idcirco dissoluēti indiget medica-
 mine, qđ quidem nō debet imodice ficcari, ne
 tenue dissoluat, & crassū in lapidē cōuertat.
 facto aut officio ipsi⁹ dissoluētis, glutinatorij
 vsus necessarius est, ne sordes medię vlceris
 coitū ipeđiat, & i lapidē cōuertant, mox qua-
 libet leui de causa putrescāt, v̄ euellant, & so-
 lutio cōtinuitatis redeat. At si ruptura p̄fun-
 dior fuerit, debet particula ipsa scarificari, vt
 medicamē magis penetret. Ruptiōi p̄terea cū
 leui fractiōe fortasse venę, sectio p̄ cura satis
 erit. At si ruptio cōtusioni adiūcta fuerit, tūc
 cōtusio debet curari medicaminib⁹ cōtusioni
 idoneis, & si cōtusio fuerit magna, curet exic-
 catib⁹, & si exigua, velut pūctura ac⁹, tūc eā na-
 turę cōmittem⁹, nisi fuerit venefica iterimēs,
 v̄ magno cruciatu dolorē afferēs, aut tetige-
 rit neruū, vnde apostema & pulsū oriri vereā-
 mur. In fractura vero ossiū sufficit leuis deli-
 gatura, nō dolorosa, & supponere medicamēta
 ad fracturas p̄pria. In casu vero v̄ ictu, v̄ alijs
 id gen⁹, necessaria est venę aptio i cōtraria pte
 facta, victusq̄ tenuitas, carniū euitatio, & id

CAPVT XXIX.

gen⁹ alia, linimētis quoq; ac potionib⁹ ad id, ia in particularib⁹ cōmentarijs inscriptis, vti par est. De soluta autē cōtinuitate, quę membris nerueis ac ossibus accidit, postea fiet sermo vbi de particularibus rebus tractabitur.

Caput vigesimūnonū sen quartæ, De vstione.



Vstio, quā cauteriū vocāt, est efficacissimū remediū, qđ valet ad phibēdam expāsiōē corruptiōis, & p̄ticulā cui⁹ intēperie corrigere cupim⁹, roborādā, materiasq; corruptas mēbro i fixas dissoluēdas sāguinisq; pfluuiū supprimēdū. Inter metalla aut instrumēta ignita, q̄b⁹ adustio fit, prætātius est aurū. loc⁹ aut vbi cauteriū fieri debet, vel sēsib⁹ dephēdiť, ita vt vstio manifeste appareat vbi nā fiat, vel locus id pfūdus erit, intra imā partē alicui⁹ mēbri sit⁹, vt est nas⁹, & os, & podex, & id gen⁹ alia, vbi oportebit aliqua formula veluti vagina vti, supra quā īclineť, vt est illud genus terre samiaē, q̄ Aster vocat, ab Arabibus talk, & vt gen⁹ illud chimoleē terre, q̄ rubrica est, vulgo sinopis, & ab Arabib⁹ magra dī: hęc igitur debet aceto p̄fundi, mox pano inuolui, & aqua rosacea aut aliquibus succis infrigidari. illaq; formula in illū meatum introducat, ita vt locum vrendū ambiat, deinde ferramentū ignitum intromittatur, vt locū pertingat, & nō lēdat quod ī circuitu

cuitu ei⁹ existit, præsertim si ferramētū illud
 yrens tenuius fuerit cauitate formulæ, ne ei⁹
 formulæ latera interna cōtingat, caueat præ-
 terea qui vrit, ne ferramēto illo ignito, vsq; ad
 neruos, & tēdines ac copulas ptrāseat. Quod
 si vstio ad sanguinē sistendū fiat, tunc validi-
 or esse debet, vt crusta quæ gigniṛ pfundior
 ac crassior sit, ne cito decidat, nā vbi sanguis
 profluat, si crusta ceciderit, mai⁹ inferet nocu-
 mētū q̄ prius. At si ad tollendā carnē corru-
 ptam vstionem feceris, & terminum incolu-
 mem deprehendere velis, scias eū esse vbi ad-
 est dolor, & fortasse cogeris vna cū carne os,
 quod sub carne existit, vrere, & vstionem infi-
 gere, donec tota eius corruptio tollatur. Si ve-
 rō id quod vritur, fuerit vt caluaria, tunc ca-
 ue ne cerebrum ferueat, & ne membranæ ipse
 cōuellant, aliās vero nō verearis itegre vrere.

Caput trigesimū sen quartæ: De dolorum mi-
 tigatione.



Aufas dolorū sub duplici genere cō-
 tineri, videlicet subita temperaturæ
 mutatiōe, solutioneq; cōtinuitatis, iā
 nosti, nec te latet has diuisiōes tandē
 deduci vel ad malā tēperaturā calidā, vel fri-
 gidam, vel siccā, sine materia aut cū materia
 humorosa, aut flatuoso spū, aut apostemate,
 mitigat̄ igit̄ dolor his q̄ cōtraria sūt illis cau-
 sis, quo

CAPVT

sis, quo aut pacto fiat contrarietas, cuique earum,
 etiam nosti, didicisti preterea quodliter curent mala
 tputura ac apostema. Ois adhuc dolor qui va-
 lidior fit, interficet quodcumque, ac prius corpori frigidi-
 tate rigoremque adfert, mox minor reddit pulsus,
 deinde penitus amittitur, postremo tandem moritur æ-
 ger. Porro quicquid dolorem mitigat, vel tputuram i-
 mutat, vel materiam dissoluit, aut sensum stupidum
 reddit, ea vero que molliunt iter facile dolorem sol-
 uentia locantur, ut anethum, & lini semine, & fertula
 campanica, que melilotus vocatur, & anthemis, que cha-
 memelon vocatur, & apij semine, amigdaleque ama-
 re, & quicunque prius ordine sunt calida, & presertim
 que aliquam glutinativam vim habent, velut gummi quod
 arbor prunorum resudat, & amygdalum, & guma ceru-
 fe, & crocum, & ladanum, althea, amomum, & bras-
 sica, rapum eorumque decoctum, adipem, & celsippi ce-
 ratum ac olea que in libris compositionum medicaminum tra-
 dita nobis sunt, ac solutiua & purgatiua medi-
 camina quicunque fuerint, huius sunt generis. porro ea que
 mollificant, debent post euacuationes administra-
 ri, si euacuatio couenerit, itidem & que apostema-
 ta maturant vel apiunt. Inter vehementer sopor-
 rativa primum est succus papaueris, seu meconio,
 quod opium vocatur, & mandragora, radicemque ipsius
 cortices, & papauer, hyoscyamus, & cicuta, & so-
 lanum soniferum, lactuca, & ex horum summa est nix,
 & aqua frigida. Scipissime preterea committitur error
 in dolo-

in dolorib⁹ q ab extrinsecis causāſ, vt à calore, vel frigidityte, aut eminetia puluinariū, aut i- cōmodo de cubitu, aut casu, dū ebri⁹ est, & alio simili, q̄rū causa iſtrinsec⁹ q̄riſ, & sic delinquit. q̄propter oportet id nō ignorare, nec latere, v- trū adſit plethora, nec ne, & ſciatur vtrū adſint cauſe ipſi⁹ plethore iā notę. Et fortasſe causa extrinsecus pueniet, & iā intrinsecus iſpreſſe- rit, velut qui aquā biberit frigidā, vnde vehe- mēs oriet̄ dolor in ptib⁹ vētriculi atq; iecino- ris. Et multoties eſt neceſſaria aliqua magna euacuatio, vel aliquod magnū praeſidiū. q̄nq; tamē ſufficit balneatio & magnus ſōnus, vt ſi quis aſſūperit aliquod calidū vnde dolore ve- hemēti caput cruciet̄, cui tñ potio aque frigi- diſſimę ſufficiēs remediū erit. fortasſe tamen id quo certam⁹ dolorē remouere, tarde impri- mit ſuā actionem, ita vt æger non poſſit dolo- rem ferre vſq; ad illud tēpus, vt eſt euacuatio materiæ retētæ in villis inteſtinorū, efficiētis dolorē inteſtini coli; aut erit velocis iſpreſſio- nis, ſed maxime ledēs, vt eſt ſoporatio illata i particulā dolore colico affectā, medicaminib⁹ id faciētib⁹, ita vt medicus de hoc negotio ma- xime erit perplex⁹. Idcirco efficaciffima cōie- ctura præditus eſſe debet, vt cognoſcat quod- nā horū duorū tēporū diuti⁹ perdurare poſſit, vtrum viriū, vel doloris conſtantia; ac vter nā horum

CAPVT

horū affectuū magis lædet, vtrū dolor ne, an nocumētū, qđ ex soporificatiōe oriri suspicamur, vt qđ cōuenienti⁹ est præponat, forte enī si dolor remāserit, interimet suo vigore & magnitudine. Sed stupor fortasse nō interficiet, q̄uis aliās lēdat. Immo fortasse poteris ei⁹ nocumentū corrigere, & iterū medicamine cōdecēri poterit curari. Verū cōstitutionē soporifici medicaminis eiusq; qualitātē inspicere oportet, vt leuiori vtamur, illudq; cū suo correctiuo remedio, qđ antidotū vocāt, cōponem⁹, nisi affectus ita esset vehemēs, vt maxia idigeret stupiditate, vel forte particula illa adfecta nihil timebit stupefactionē, si in ea administret, quia nō inferet inde maximū nocumētū, vt stupefactiuū medicamē admoueat, vel forte erit tuta potio medicaminis stupefactiui, vt sit in dolore oculi: nā min⁹ hęc lēdit oculū, q̄ linire ipsū. Et forte poterit facile corrigi nocumentū pueniens ex potatiōe illi⁹, in alijs mēbris. At in dolore coli ītestini crescit lēsiō: qm̄ materia augebit frigiditatē, & cōgelationē, ac duriciē. Medicamina præterea stupefaciētia qñq; mitigāt dolorē, ppter ea q̄ dormire faciūt: nā sōnus īter causas doloris mitigatiuas referit: præsertim si secū inedia associet ī dolore materiali. Stupefactiua vero cōposita, quorū vis medicaminib⁹ correctiuis refringit, tutiora sunt, vt
est

est medicamen philoniũ, & trochisci noiati de
trib⁹ cõpositio vocata diatrion, verũ min⁹ stu-
pefaciunt, & recētiora eorũ vehementi⁹, anti-
quiora vero nihil, media vero mediocriter stu-
pefaciũt. Dolorũ p̃terea aliq̃ sunt validissimi,
qui tñ facillime curant̃ in quibusdã t̃pibus, vt
sunt qui ex spiritu flatuoso ortũ hñt. Immo
qñq̃ mitigant̃, ac eis sat est irrigationẽ aque ca-
lidæ superfudisse, verũ illud remediũ vnũ mi-
nat̃ periculũ, videlicet ne si forte causa dolo-
ris fuerit apostema, & existimat̃ esse ventosus
flatus, cui si, ĩ initio p̃sertim, superfundat̃ a-
qua calida, augebit̃ nocumẽtũ. Immo fortasse
nocebit etiã in flatuoso, cũ nequiuerit flatum
dissoluere, & expãsiõ q̃titatis ei⁹ inde augebit̃.
Fomentatiões etiã quę calefaciunt, ṽtositatẽ
curat̃: & ĩter hmõĩ medicamina prætātius est
qđ exiccat, vt miliũ: nisi forte illud mēbrũ id
nō sustinuerit, vt ocul⁹, qui quidẽ impositione
pannorũ calidorũ calefit, fiunt adhuc fomēta
oleo calefacto. Validi⁹ p̃terea fomentũ est, si
farina erui ex aceto coquat̃ & exicceť, deinde
fiat ex ea fomētũ. Ad id vero inferi⁹ remediũ
est furfuris decoctũ, vapor p̃terea salis mor-
det, miliĩ quidẽ eo prætātior, verum debilior
est, qñq̃ adhuc fit fomētũ ex aqua p̃ vesiculã,
qđ quidẽ & tuti⁹ & lenius est. Verũ nisi ani-
maduertat̃, efficeret qđ paulo ante dictũ fuit.
Ad hæc

CAPVT

Ad hęc cucurbitule ignite sūt huius generis maximeq; dolorē sedant flatuosum, & si iterū repetatur tollet penitus dolor, verū ex huiusmodi remedio pōt accidere quod supra dictū est, sedat̃ preterea dolor leui deambulatione ac diuturna, ppter̃ea quod mollit. Itidē & tenues adipēs satis noti, oleaq; iā nobis enarrata, porro suauis melodia musicalis, p̃serti quæ somnū induxerit, ac his quę lētitia afferunt vacare, validissimum mitigat dolorem.

Caput trigessimū primum, seu quartæ.



SI duo simul cōcurrāt morbi, ab eo incipiendū est qui habet vnū triū horū p̃priorū. primū est, vbi nō possit secūdus morbus curari nisi curet ipsemet: vt apostema & vlcus si cōiugātur. primo enī apostema curabim⁹, donec mala intēperatura, quę illi cōiuncta est, auferat̃. qua existēte nō poterit vlcus curari: mox vlcus ipsū curabitur. secundū, vbi alter alterius adfect⁹ fuerit causa, vt cū opilatio & febris cōeāt, prius enim opilationē, secūdo febrē curabim⁹, nec febrē timebimus, vbi opilationē his quę calefaciūt apire velimus. Phthisim vero exiccātib⁹ curabimus: febrisq; in nulla erit cōsideratiōe, qm̃ impossibile est febrē tollere, eius causa adhuc relicta, cui⁹ causę curatio est ipsa exiccatio, quę quidē febrē officit. Tertiū vero, vbi alter altero

ter altero affectu periculosior fuerit, vt si febris cōtinēs, quę synoch⁹ nominat̃, cōiungat̃ resolutioni, quā paralyfim vocāt, tūc enī synochū extinguētib⁹ remedijs, ac venę sectiōe curabimus, paralyfim q̃ despiciemus. At vbi morbus cū accidēti coierit, tūc morbū curare incipiemus, nisi accidēs morbo p̃ualuerit, tūc enim accidēti curā adhibebim⁹, morbū vero nō cōsiderabimus, vt ī vehemētissimo ac difficili intestini coli dolore, vbi quidē p̃pinamus quę stupefaciūt, q̃uis per se colo noceat. Itide q̃nq̃ postponimus sāguinis emissionē, q̃uis esset cōueniēs, p̃pterea q̃a adest ībecillitas vētriculi, aut p̃cesserit alui deiection, ṽf nausea p̃sēs fuerit; & forte nō tardabim⁹, imo venā secabim⁹; sed causam ipsam totā omnino nō abscindemus, quēadmodū in morbo cōuulsionis nolimus totū humorē discutere, imo de eo aliquid relinquit⁹, vt à cōuulsio motu dissoluat̃, manēte interī natiuo humido nō dissoluto. Hęc igit̃ sūma breuiū sermonū nostrorū artis Medicinę, de vniuersalib⁹ regulis satis sit. nūc vero ad eā ptē opis nostri, quę de simplicib⁹ medicamentis tractat, nos deo duce accingemus.

FINIS.

Parisijs in officina Claudij Chcuallonij.

Anno 1532



Accession no.

29524

Author

Avicenna.

Avicennae arabis
medicorum ob succin

Call no.

ctam, 1532

Classics



4. AVICENNA (ibn Sina).— Avicennae Arabis Medicorum ob succinctam brevitatis copia, facile principis Quarta fen, primi de universaliratione medendi (ex Hebr.) Interprete JACOB MANTINO medico Hebreo. Parisiis, in officina Claudii Chevalloni, 1532. 8^o. old boards. (LXIV lvs.). Hfl. 675.-

EXTREMELY SCARCE.— cf. Hirsch I, 356-9; unknown. Friedenwald, p.107, this ed.unknown; Wininger, Jüd.Nat.Biogr.,IV-259; Jüd.Lex.III, 1369; cf.Steinschn.Cat.Bodl.4486, sub 2 and his ample note; this ed.unknown and no.5575, ample note reg.J.Mantino : this ed.also unknown. Unknown to: Brunet and Graesse. The translator of the book. Jakob b.Samuel Mantino (1490-1549) was court-physician to Pope Paul III. By translating medical and metaphysical work from Arab and Hebrew into Latin he gave an important contribution to deeping of medical science. He wrote important medical works as well. With fine printer's device on titlepage.

(Mayer)
Rampere
Wendel,
1972

Gr. Faust 1, 184; 111, 222; St. Cat. Bod. 2300, nr. 33. This important Ms. most probably is a contemp. latin transl. of the "Clavicula Salomonis & Theosophia Pneumatica", Wesel. Duisb., Frankfurt, 1686 by A. Luppius (as appears from a contemp. annotation 1st fly-leaf). Due to the fact that Andr. Luppius himself suppressed or the original work only a few copies survived. (cf. Steinschn. C.B. 2299, further data given in our descr. of item 44 of this list).

9. CL

no:

no:

"PAPIERE WERELD"
SALOMON S. MEYER
Antiquariaat-Graphiek
Hebraica-Judaica
Kalverstr. 12 Amsterdam-C.
(Ing. Jonge Roelensteeg 2a)
Telefoon 244710-715782

Etudes et commentaires sur le Cde de l'Ecluse augments de quelques
graphiques par G. Istanfffi de Csik-Madefalva. Budapest, 1900. fol. fine hlf.
vs. inside. (3 lvs., 287 pp. text). Hfl. 690.-

of the famous Clusius Codex from the Univ. Libr. of Leyden, "Fungorum in
Pannoniis observatorum brevis historia a Carolo Clusio trebate conscripta".
First integral reprod. of the "Clusius-Codex", privately printed, enlarged by biograph-
ical notes; with 91 (misnumbered) "planches excutes en chromolithographie" (from the